DUS DATA®

DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

EKİM 2022

DUS

Orijinal Sorular

2022 DUS

İlk 10'da 8
İlk 100'de 85
kişi

2020 DUS (Mart 2021)

İlk 10'da 8
İlk 100'de 79
kişi

2019 DUS

İlk 10'da 6
İlk 100'de 74
kişi

TUSDATA® TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DUSDATA® DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TUSDATA® YAN DAL HAZIRLIK MERKEZLERİ

BAŞARI NEDİR?

Her alanda, sürekli ve kitlesel başarı....

	Sınav birincisi	İlk 10	İlk 100	Ek not
2022 Eylül **TUS**	1. TUSDATA'dan Dr. Hamza TEMİZ	9 kişi	86 kişi →	Bunların 69 tanesi Fakülte derecesi DEĞİLDİ! Bunların 17 tanesi 3 büyük ilde DEĞİLDİ!
2022 **DUS**	2. DUSDATA'dan Dt. Derya PINAR	8 kişi	85 kişi →	Bunların 76 tanesi Fakülte derecesi DEĞİLDİ! Bunların 47 tanesi 3 büyük ilde DEĞİLDİ!
2022 **YDUS** Pediatri	1. TUSDATA'dan Uz. Dr. Semra AYDURAN	8 kişi	68 kişi	
2022 **YDUS** Dahiliye	1. TUSDATA'dan Uz. Dr. Fazıl Ç. HUNUTLU	4 kişi		
2022 **YDUS** Genel Cerrahi	1. TUSDATA'dan Uz. Dr. Ersan ÖZKARDEŞLER	4 kişi		
2022 **YDUS** Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi	1. TUSDATA'dan Uz. Dr. Görkem ARICA	3 kişi		



Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

Bu tablonun tek anlamı: İşimizi "aşkla"; gerçekten çok iyi yapıyoruz.

Başarı; İSPAT demektir, başarı SÜREKLİLİK demektir.

DUS EKİM 2022
TEMEL BİLİMLER TESTİ

1. Arteria facialis'in proksimal kısmındaki bir tıkanmanın aşağıdaki damarlardan hangisindeki kan akımını bozması en olasıdır?

A) Arteria palatina ascendens
B) Arteria pharyngea ascendens
C) Arteria palatina descendens
D) Arteria auricularis profunda
E) Arteria masseterica

2. Aşağıdaki yapılardan hangisi nazofarinkste yer almaz?

A) Torus tubarius
B) Tonsilla pharyngea
C) Recessus pharyngeus
D) Recessus piriformis
E) Plica salpingopharyngea

3. Corpus linguae'nin lateral bölümünde şişlik yakınmasıyla başvuran hastada, kitlenin malign karakterli olduğu belirleniyor.

Kitle kaynaklı metastazın ilk olarak yayılacağı en olası lenf nodu grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nodi mastoidei
B) Nodi submentales
C) Nodi cervicales laterales profundi interiores
D) Nodi preauriculares
E) Nodi submandibulares

4. Aşağıdaki yumuşak damak kaslarından hangisinin inervasyonu diğerlerinden farklıdır?

A) Musculus tensor veli palatini
B) Musculus levator veli palatini
C) Musculus uvulae
D) Musculus palatoglossus
E) Musculus palatopharyngeus

5. Aşağıdaki damarlardan hangisinin tıkanmasının beynin arteriyel dolaşımında bozukluğa neden olması en olasıdır?

A) Arteria axillaris
B) Arteria brachialis
C) Arteria subclavia
D) Arteria occipitalis
E) Arteria maxillaris

6. Mandibular anestezi esnasında enjektör ucunun ramus mandibulae iç yüzüne yaslanarak aşırı ilerletilmesi durumunda komplikasyon olarak girilmesi en olası anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glandula parotidea
B) Çene eklemi kapsülü
C) Glandula submandibularis
D) Tonsilla palatina
E) Nervus maxillaris

7. Aşağıdakilerden hangisi diş etinde tutunma epiteli (junctional epithelium) ile diş yüzeyinin bağlantı bileşkesidir?

A) Zonula adherens
B) Gap junction (neksus)
C) Fokal adhezyon
D) Zonula okludens
E) Hemidesmozom

8. Aşağıdaki endokrin organların hangisinde salgı hücre dışında depolanır?

A) Paratiroid **B)** Tiroid
C) Adenohipofiz **D)** Adrenal bez
E) Epifiz

9. Lingual papillalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Papilla filiformis keratinize hücreler içerir.
B) Fungiform papillaya von Ebner bezleri açılır.
C) Papilla filiformis tat tomurcuğu içermez.
D) Sirkumvallat papilla sulkus terminalisin ön kısmına yerleşir.
E) Papillalarda tat tomurcukları epitel içerisinde bulunur.



10. Yüksek endotelli venüller aşağıdaki organlardan hangisinin parakorteks (derin korteks) tabakasında bulunur?

A) Dalak
B) Timus
C) Lenf düğümü
D) Böbrek
E) Duodenum

11.

I. İzotoniktir.
II. Lingual lipaz içerir.
III. Yüksek konsantrasyonda Na^+ ve Cl^- içerir.
IV. Düşük konsantrasyonda K^+ ve HCO_3^- içerir.

Plazma ile karşılaştırıldığında, tükürük bezi asiner hücreleri tarafından kanallar içerisine salgılanan primer salgının özelliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

12. Aşağıdakilerden hangisi ön hipofiz hormonlarından biri <u>değildir</u>?

A) Tiroid stimüle edici hormon
B) Lüteinize edici hormon
C) Folikül stimüle edici hormon
D) Adrenokortikotropik hormon
E) Oksitosin

13. Aşağıdaki proteinlerden hangisi bir alt birimine Ca^{+2} bağlanması ile iskelet kasının kasılmasına aracılık eder?

A) Troponin
B) Tropomiyozin
C) Kalmodulin
D) Nebulin
E) Riyanodin



14. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin uyarılması pozitif kronotropik etkiye neden olur?

A) α_1
B) β_1
C) β_2
D) Muskarinik
E) Nikotinik

15. Kendiliğinden uyarı çıkararak solunumun <u>temel</u> ritmini oluşturan nöron grupların yerleştikleri bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serebral korteks
B) Hipotalamus
C) Medulla (beyin sapı)
D) Nukleus parabrakialis
E) Retiküler aktive edici sistem

16. Konuşulanı ve yazılı bir ifadeyi anlayamayan bir kişide aşağıdaki beyin merkezlerinden hangisi zarar görmüştür?

A) Limbik asosiyasyon alanı
B) Wernicke alanı
C) Broca alanı
D) Angular girus
E) Prefrontal asosiyasyon alanı

17. Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde amino asitlerin aktivasyonundan sorumlu aminoaçil-tRNA sentetazın katalizlediği reaksiyonda kullanılan yüksek enerjili fosfat bileşiğidir?

A) ATP
B) CTP
C) GTP
D) UTP
E) TTP

18. Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum fosfor metabolizmasını düzenleyerek periodontal dokular üzerine önemli etki gösterir?

A) A vitamini
B) C vitamini
C) D vitamini
D) E vitamini
E) K vitamini

19. Keton cisimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi <u>yanlıştır</u>?

A) Vücut sıvılarında çözünebilir.
B) Kan beyin bariyerini geçebilir.
C) Yağ asiti oksidasyonu ile oluşan Asetil-KoA'lardan sentezlenir.
D) Beyin ve karaciğer için önemli yakıt kaynağıdır.
E) Kontrolsüz diabetes mellitus'ta aşırı üretimi ketoasidoz tablosuna yol açabilir.

DUSDATA HAZIRLIK MERKEZLERİ

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DUS notlarımız KAÇ SORU yaptırdı?

- Herkes *"en çok soruya biz referans olduk"* diye iddia ediyor.
- Her iddia **İSPAT** ister. İddia ile ispat **UYUMLU** olmalıdır...



DUS Şampiyonların Notu

116 soruya referans verdi

İki ciltte toplam sadece **716** sayfa



DUS Hızlı Tekrar Notları

102 soruya referans verdi

Buyrun İDDİA ile İSPAT'ın MÜKEMMEL UYUMU

İlk 10'da	İlk 20'de	İlk 100'de
8 kişi	**19** kişi	**85** kişi

20.

I. Sekretuvar IgA
II. Amilaz
III. Sodyum bikarbonat
IV. Karbonik anhidraz
V. Peroksidaz

Yukarıdakilerden hangisileri tükürüğün pH tamponlama etkisini düzenleyerek diş yüzeyini stabilize eden efektörlerdendir?

A) I ve II
B) Yalnız V
C) III ve IV
D) Yalnız I
E) Yalnız II

21.

I. Atrial natriüretik faktör
II. Glukagon
III. Tiroid stimüle edici hormon

Yukardaki hormonlardan hangilerinin ikincil habercisi cAMP'dir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I,II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisi okzaloasetat üzerinden sitrik asit döngüsüne girer?

A) Prolin **B)** Aspartat
C) Glutamin **D)** Arjinin
E) Histidin

23. Sterilizasyonu dezenfeksiyondan ayıran en önemli mikrobisidal özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Virüsidal
B) Bakterisidal
C) Fungusidal
D) Mikobakterisidal
E) Sporosidal



24. Kistik fibrozis hastalarının solunum yolu örneklerinden izole edilen mukoid Pseudomonas aeruginosa kolonilerinin oluşmasından aşağıdaki virülans faktörlerinden hangisinin aşırı miktarda üretimi sorumludur?

A) Ekzotoksin A
B) Fosfolipaz C
C) Ekzoenzim S
D) Alginat
E) Piyosiyanin

25. X ve V faktörlerine ihtiyacı olmamasına rağmen, klinik örneklerden üretilebilmesi için çikolatamsı agar besiyerine ihtiyaç duyan, koyun kanlı agarda üremeyen en olası patojen bakteri aşağıdakilerden hangisisdir?

A) Bordetalla pertussis
B) Corynebacterium diphtheriae
C) Moraxella catarrhalis
D) Niesseria gonorrhoeae
E) Haemophilus influenzae

26. Ağız çevresi soluk ve yanakları eritemli 6 yaşındaki kız çocuğuna 5. hastalık tanısı konuyor.

Bu tabloya yol açan viral etkenin özellikleri ile ilgisi aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Zarflı DNA virusudur.
B) Virion helikal kapsid içerir.
C) Genomu tek iplikli, lineer DNA'dır.
D) Replikasyon sitoplazmada gerçekleşir.
E) Hücre membranından tomurcuklanarak serbest kalır.

27. Aşağıdakilerden hangisi kapsüllü bir maya mantarıdır?

A) Cryptococcus neoformans
B) Candida albicans
C) Trichosporon asahii
D) Geotrichum candidum
E) Malassezia furfur

28. Canlı aşılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Adjuvan gereksinimi fazladır.
B) Ortam koşullarında stabildir.
C) Kısa süreli bağışıklık sağlar.
D) Kuvvetli hücresel immün yanıt oluştururlar.
E) Etkin uyarım için çok sayıda uygulama gerekir.

29. Akut bakteriyel bir enfeksiyonda nötrofil kemotaksisinden aşağıdakilerden hangisi öncelikle sorumludur?

A) Lipoksin
B) Bradikinin
C) Hageman Faktör
D) Histamin
E) Kompleman 5a

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

klinisyen tıp kitabevleri

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ekim 2022 DUS'TA Derecelerimiz şerefine

İlk 10'da	İlk 20'de	İlk 100'de	İlk 200'de
8 kişi	19 kişi	85 kişi	164 kişi

TUS - DUS - YDUS YAYINLARIMIZDA

7 - 17 Kasım tarihleri arasında

%40 İNDİRİM

İndirimler liste fiyatı üzerinden yapılmaktadır.

Sadece www.klinisyen.com sitemizde geçerlidir.

www.dusdata.com

30. Mukozal pemfigus grubu hastalıklar hangi tip hipersensitivite reaksiyonu sonucu gelişir?

A) Allerjik tip hipersensitivite
B) Antikor aracılı hipersensitivite
C) Dolaşan immun kompleks aracılı hipersensitivite
D) Gecikmiş tip hipersesnsitivite
E) T hücre aracılı sitotoksisite

31. Tip 1 hipersensitivitede hücre içerisinde hazır olarak bulunan, erken reaksiyonda damar dilatasyonu ve geçirgenlik artışından öncelikle sorumlu olan medyatör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Histamin
B) Lökotrien B4
C) Prostoglandin D2
D) Platelet aktive edici faktör
E) İnterlökin-5

32. Mukus ekstravazasyon fenomeni en sık hangi lokalizasyonda görülür?

A) Dil laterali
B) Damak
C) Alt dudak
D) Yanak
E) Ağız tabanı

33. Aşağıdakilerden hangisi tirozin kinaz türü reseptörlere örnektir?

A) $GABA_A$ reseptörü
B) Epidermal büyüme faktörü reseptörü
C) Alfa-2 adrenerjik reseptör
D) Beta-1 adrenerjik reseptör
E) Progesteron reseptörü

34. Aşağıdaki ilaç etkileşimlerinden hangisi, mide pH değerinin yükselmesi sonucunda ortaya çıkar?

A) Trisiklik antidepresan kullanımına bağlı parasetamol absorbsiyonunun azalması
B) Antiasit ilaç kullanımına bağlı ketokonazol veya itrakonazol absorbsiyonunun azalması
C) Prokinetik ilaç kullanımına bağlı parasetamol absorbsiyonunun artması
D) Prokinetik ilaç kullanımına bağlı parasetamol absorbsiyonun azalması
E) Kolestiramin kullanımına bağlı linkomisin absorbsiyonunun azalması

35. Aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisinin gram negatif etkinliği yoktur?

A) Penisilinler
B) Sefalosporinler
C) Aminoglikozitler
D) Glikopeptidler
E) Kinolonlar

36. Aşağıdakilerden hangisi, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin dokuda bradikinin ve P maddesi gibi proinflamatuvar mediatörlerin artışına bağlı olarak ortaya çıkan yan etkisidir?

A) Kuru öksürük
B) Hipotansiyon
C) Akut renal yetmezlik
D) Hipovolemi
E) Hiperkalemi

37. Aşağıdaki moleküllerden hangisi basit difüzyon ile plazma membranından geçemez?

A) O_2
B) N_2
C) Na^+
D) NO
E) CO_2

38.

I. tRNA
II. Histonlar
III. Laminler
IV. DNA polimeraz

Ökaryot hücrelerde yukarıdaki moleküllerden hangilerinin çekirdek zarı aracılığıyla sitozole taşınması gerçekleşmez?

A) Yalnız III
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve IV
E) II, III, IV

39. Aşağıdakilerden hangisi antisipasyona neden olur?

A) Gen duplikasyonu
B) Çerçeve kayması mutasyonu
C) Yanlış anlamlı mutasyon
D) Dinamik mutasyon
E) Anlamsız mutasyon

40. Psödogenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dizileri fonksiyonel gene benzerlik gösterir.
B) Yüksek oranda translasyona uğrarlar.
C) Gen duplikasyonları ile oluşurlar.
D) Ekzon, intron ya da her ikisini de içerebilirler.
E) Dizide pek çok mutasyon barındırırlar.



DUS EKİM 2022
KLİNİK BİLİMLER TESTİ

1.

I. Rezin modifiye cam iyonomerlerden daha fazla florid salımı yaparlar.
II. Diş dokusuna bağlanmaları için uygulanmaları öncesinde adeziv sistem uygulanmalıdır.
III. Aşınma dirençleri rezin modifiye cam iyonomer ile kompozit rezin arasındadır.

Kompomerlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

2. **Aşağıdaki etkenlerden hangisi dışsal kaynaklı renklenmeye neden olmaz?**

A) Dişin gelişimi esnasında aşırı florür içeren içeceklerin tüketimi
B) Mine yüzeyinde Nasmyth membran artıklarının kalması
C) Kötü ağız hijyeni
D) Renklendirici yiyecek ve içecek alışkanlıkları
E) Periodontal problemler

3.

I. Asidüle fosfat florür (%1,23)
II. Gümüş diamin florür (%38)
III. Yüksek florürlü diş macunları

Yukarıda verilen florür bileşiklerinin, içerdiği florür miktarına (ppm) göre, en çoktan en aza doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I-II-III
B) II-I-III
C) II-III-I
D) III-I-II
E) III-II-I



4. **Uyarılmamış tükürükte etkili olan tamponlama mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Fosfat
B) Protein
C) Karbonik asit/bikarbonat
D) Karbonat
E) Sitrat

5.

I. Elastik modülü yüksektir.
II. Çürüksüz Sınıf V restorasyonlarda kullanımları fayda sağlayabilir.
III. Geniş kompozit restorasyonların altına stres kırıcı olarak uygulanabilir.
IV. Pit ve fissür örtücü olarak kullanılmamalıdır.


Akışkan kompozit rezinler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) I, II ve IV
B) I ve IV
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) III ve IV

6. **Aşağıdakilerden hangisi amalgamasyon sonucu oluşan gama-2 fazını belirtir?**

A) Ag-Hg
B) Sn-Hg
C) Ag-Sn
D) Sn-Zn
E) Sn-Cu

7.



Yukarıdaki şekilde çizili Munsell renk sisteminde ok işareti ile gösterilen ve rengin gücünü/yoğunluğunu ifade eden renk terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hue
B) Value
C) Kroma
D) Translüsensi
E) Transparansi

DUS DATA
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

İlk 10'da **8** kişi

İlk 20'de **19** kişi

İlk 100'de **85** kişi

İlk 200'de **164** kişi

2022 DUS'ta

İllere ve fakültelere bakın!

Sıra	Adı Soyadı	Fakültesi	Fakülte Derecesi
2	Dt. Derya PINAR	Marmara DİŞ İstanbul DUSDATA	DEĞİL
3	Dt. Halime ERTÜRK	Adnan Menderes DİŞ Aydın DUSDATA	+
4	Dt. Mümine GÖKYER	Selçuk DİŞ Konya DUSDATA	DEĞİL
5	Dt. Aybüke ÖZYALIN	İnönü DİŞ Malatya DUSDATA	DEĞİL
5	Dt. Hüseyin EFE	Süleyman Demirel DİŞ Isparta DUSDATA	DEĞİL
7	Dt. Elif ÇELİK	Ankara DİŞ Ankara DUSDATA	DEĞİL
8	Dt. Sadık ARSLAN	Gazi DİŞ Ankara DUSDATA	DEĞİL
9	Dt. Elmas LİV	Bülent Ecevit DİŞ Zonguldak DUSDATA	+

Bu tablo; okul derecesi farketmeksizin herkese ama herkese **UMUT** vermiyor mu?

8. Kompozit rezinlerin yapısına viskoziteyi azaltmak ya da kontrol etmek amacıyla katılan monomer aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEGDMA
B) Bis-GMA
C) UDMA
D) 10-MDP
E) 4-META

9. Üre ve hidrojen peroksitten oluşan beyazlatma ajanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum askorbat
B) Pyrozon
C) Süperoksol
D) Karbamid peroksit
E) Sodyum perborat

10. Rutin kontrol nedeniyle kliniğe başvuran, 25 yaşındaki erkek hastanın ağız içi muayenesinde, üst anterior dişlerin palatal yüzeylerinde ve üst molar dişlerde çürüksüz servikal lezyonlar saptanmış ancak alt molar dişlerin lingual yüzlerinde herhangi bir diş sert doku aşınmasına rastlanmamıştır.

Bu hastanın mevcut durumu için aşağıdakilerden hangisi en olası etiyolojik faktördür?

A) Asitli içecekleri sık tüketiyor olması
B) Yanlış diş fırçalama alışkanlığına sahip olması
C) Profesyonel yüzücü olması
D) Astım inhalatörü kullanıyor olması
E) Gastroözofageal reflü şikâyetinin olması

11. Aşağıdakilerden hangisi, mandibular daimî ikinci molar dişte lingual gelişimsel oluk ile birleşerek aynı yönde uzanan gelişimsel oluktur?

A) Meziobukkal
B) Distobukkal
C) Bukkal
D) Meziolingual
E) Distolingual



12. Anterior bölgede yapılan tam seramik bir sabit restorasyonun rezin simanla simante edileceği bir hastada preparasyon sonrası geçici restorasyonların simante edilmesi planlanıyor.

Bu hasta için aşağıdakilerden hangisinin geçici siman olarak kullanımı, daha sonra daimî simantasyon için uygulanacak rezin simanın polimerizasyonunu olumsuz etkileyebilir?

A) Çinko fosfat
B) Çinko oksit öjenol
C) Çinko polikarboksilat
D) Cam iyonomer
E) Silikat

13.

I. Derin dikey kapanışı olan vakalarda uygulanması kontrendikedir.
II. Preparasyonda singulum/okluzal tırnak şeklinde vertikal durdurucuların hazırlanması önerilir.
III. Retansiyonu artırmak amacıyla preparasyon marjini subgingival hazırlanmalıdır.

Rezin-bağlı (adeziv) köprüler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) II ve III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

14.

I. Dudakların incelmesi
II. Nazolabial oluğun derinleşmesi
III. Kolumella ile filtrum arasındaki açının azalması

Yukarıdakilerden hangileri tam dişsizlik durumunda, kemik kaybına bağlı olarak yüzde görülebilecek değişikliklerdendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

DUS DATA
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

O SEN OLSAN BARİ


Sadece fakülte derecelerine mi derece yaptırıyoruz?

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz	İlk 100'de ama fakülte DERECE'si olmayan kursiyer sayımız	İlk 100'de ama üç Büyük İl'de olmayan kursiyer sayımız
DUS Ekim 2022 sınavında	76 kursiyerimiz	47 kursiyerimiz
	*Bu sınavda ilk 100'de 85 kursiyerimiz vardı.	
DUS Ekim 2021 sınavında	38 kursiyerimiz	16 kursiyerimiz
	*Bu sınavda ilk 100'de 64 kursiyerimiz vardı.	
DUS Mart 2021 sınavında	43 kursiyerimiz	14 kursiyerimiz
	*Bu sınavda ilk 100'de 66 kursiyerimiz vardı.	
DUS Ekim 2020 sınavında	55 kursiyerimiz	15 kursiyerimiz
	*Bu sınavda ilk 100'de 72 kursiyerimiz vardı.	



İsim isim detayları görmek için www.dusdata.com'u ziyaret ediniz.


15.



Şekilde verilen maksiller kısmî dişsiz hastada planlanacak hareketli bölümlü protezin indirekt tutucuları ideal olarak hangi dişlerde ve şekilde konumlandırılmalıdır?

A) Sağ ve sol kanin dişlerde, singulum tırnağı şeklinde
B) Sağ ve sol lateral dişlerde, insizal tırnak şeklinde
C) Sağ ve sol ikinci premolar dişlerde, disto-okluzal tırnak şeklinde
D) Yalnızca sol kanin dişte, insizal tırnak şeklinde
E) Yalnızca sağ ikinci premolar dişte, mezio-okluzal tırnak şeklinde

16. Aşağıda modeli görülen, mevcut doğal dişlerin periodontal destekleri sağlıklı ve rezidüel kret yükseklikleri yeterli olan bir vaka için hareketli bölümlü protez restorasyon planlanacaktır.



Bu vaka için aşağıdaki ana bağlayıcı ve gerekçe eşleştirmelerinden hangisinin tercih edilmesi en uygundur?

	Ana bağlayıcı	Gerekçe
A)	Palatal bar	İnce döküldüğü hâlde rijit ve hastalar için en konforlu olan ana bağlayıcı olması
B)	U plak	Anterior dişsiz boşluklar bulunması ve indirekt tutuculuk ihtiyacı
C)	Palatal bant	Az yer kaplayan ve en rijit ana bağlayıcı olması
D)	Tam palatal plak	Destek dişlerin asimetrik dağılımı nedeniyle proteze maksimum desteklik sağlaması
E)	Palatal bant	Bilateral dişsiz boşluklar bulunması

17. Aşırı kron boyu mesafesinin doğrudan biyomekanik kuvveti artırdığı implant vakalarında aşağıdakilerden hangisi uzun dönem implant başarısı açısından hatalı bir uygulamadır?

A) Kantilever uzunluğunun azaltılması
B) İmplant sayısının artırılması
C) İmplant çapının artırılması
D) Okluzal tablanın daraltılması
E) İmplanta non-aksiyel kuvvet yönlendirilmesi

18.

I. Daimî obturatör yapımına postoperatif 3.-4. aydan sonra geçmek uygundur.
II. Daimî obturatörlerde stabilite, rezeksiyon sonrası kalan dişler ve mukozadan sağlanmalıdır.
III. Tedavi obturatörlerinde yumuşak astar materyali kullanımı hastanın konforunu artırır.

Obturatörler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) II ve III

19. Sağ temporomandibular ekleminde ağrı ve ses şikâyetleriyle başvuran hastanın muayenesinde, sağ eklemde resiprokal klik, sağ eklemde palpasyonda hassasiyet, sağ ve sol masseter kaslarında hassasiyet ve ağzın açılması sırasında deviasyon görülüyor. Maksimum ağız açıklığının normal sınırlarda olduğu saptanıyor. Radyolojik incelemede eklem yüzeylerinde dejeneratif değişiklik tespit edilmiyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Myospasm
B) Koruyucu ko-kontraksiyon
C) Redüksiyonlu disk dislokasyonu
D) Redüksiyonsuz disk dislokasyonu
E) Fibromiyalji

20. Aşağıdakilerden hangisi, porselen lamina restorasyonların endikasyonlarından biridir?

A) Bruksizme bağlı aşınmış dişlerin restorasyonu
B) Malforme dişlerin restorasyonu
C) Doku kaybı fazla olan endodontik tedavili dişlerin restorasyonu
D) İleri derecede abrazyona bağlı mine kaybı olan dişlerin restorasyonu
E) İleri derecede protrüze olmuş dişlerin restorasyonu

DUS DATA
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DUS 2022 (Ekim)

İL BİRİNCİLERİMİZ

14 DUS
12 BİRİNCİ



DUS 2021 (Ekim)

İL BİRİNCİLERİMİZ

13 DUS
12 BİRİNCİ



DUS 2020 (Mart)

İL BİRİNCİLERİMİZ

12 DUS
11 BİRİNCİ



21. Aşağıdaki durumların hangisinde alloplastik temporomandibular eklem rekonstrüksiyonu kontrendikedir?

A) Avasküler nekroz
B) Şiddetli kondil rezorpsiyonu
C) Büyük iyi huylu tümörlerin çıkarılmasını takiben
D) Aktif ya da kronik enfeksiyon varlığı
E) Malign tümör eksizyonu sonrası

22. Temporomandibular eklem artroskopisinde ekleme giriş yerinin belirlenmesi için çizilen Holmlund-Hellsing hattı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Gözün leteral kantusu – Angulus mandibula
B) Angulus mandibula – Ağız köşesi
C) Gözün lateral kantusu – Tragusun orta noktası
D) Tragusun orta noktası – Ağız köşesi
E) Gözün medial kantusu – Tragus

23. Glossofaringeal nevralji aşağıdaki kafa çiftlerinden hangisinden kaynaklanır?

A) V
B) IX
C) VII
D) VIII
E) XII

24. Hiperventilasyon sendromu gelişen bir hastada aşağıdaki bulgu ve belirtilerden hangisi gözlenmez?

A) El ve ayak parmaklarında uyuşukluk
B) Artmış anksiyete
C) Baş dönmesi
D) Sık nefes alıp verme
E) Ağızdan artmış sekresyon

25. Vazirani-Akinosi tekniğiyle lokal anestezi uygulaması yapıldığında aşağıdaki sinirlerden hangisinin anestezi altına alınması hedeflenmez?

A) Pterigopalatin sinir
B) İnferior alveoler sinir
C) Mental sinir
D) İnsiziv sinir
E) Lingual sinir



26. Endemik Burkitt lenfoma vakalarının büyük çoğunluğunda etken olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cytomegalovirus
B) Varicella-zoster virus
C) Epstein-Barr virus
D) Papillomavirus
E) Coxsackie virus

27. Oral melanositik nevusun (mukozal melanositik nevus) en yaygın görüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanak
B) Dudak
C) Dil
D) Damak
E) Tonsil

28.

I. Radyoterapinin uygulandığı bölge
II. Hastanın ağız hijyeni
III. Toplam radyasyon dozu

Yukarıdakilerden hangileri, çenede oluşan osteoradyonekrozun gelişmesindeki risk faktörlerindendir?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız I

29. Odontojenik enfeksiyonların evreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnokülasyon evresinde semptomlar genellikle düşük seviyeli ağrı ve hafif şişlik ile karakterizedir.
B) Apsenin spontan veya cerrahi olarak drenajı ile rezolüsyon evresi başlar.
C) Selülit evresinde şişlik lokalize iken apse evresinde difüz karaktere geçer.
D) İnokülasyon evresi aerobik bakteri predominansı ile karakterizedir.
E) Apse evresinde şişliğin merkezi yumuşak ve parlak görünümlüdür.

30. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi, tükürük bezi enfeksiyonlarında diğerlerine göre daha sık görülen bir etkendir?

A) Staphylococcus aureus
B) Prevotella spp.
C) Porphyromonas spp.
D) Cytomegalovirus
E) Fusobacterium spp.

31. Kırk beş yaşındaki kadın hastadan yirmi yaş dişlerinin değerlendirilmesi amacıyla alınan panoramik radyografta mandibular premolar ve molar bölgede, bilateral, diş kökleri ile ilişkili, düzenli sınırlı, radyolüsent alanın merkezinde radyoopasiteler izleniyor. Klinik muayenede bilateral 1. ve 2. molar dişlerinde tek yüzlü kompozit dolguları olduğu ve bu dişlerle ilgili herhangi bir ağrı ya da şişlik şikâyeti olmadığı öğreniliyor. Lezyonla ilişkili dişlere vitalite testleri yapılıp ilgili dişlerin vital olduğu belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osteoporoz
B) Semento-ossifiye fibroma
C) Kondensing osteitis
D) Fibröz displazi
E) Florid semento-osseöz displazi

32. Kırk beş yaşındaki erkek hasta, sağ bukkal mukozasında 1,5 yıldır var olan, beyaz lezyon nedeniyle başvuruyor. Klinik muayenede lezyonun homojen beyaz plak şeklinde olduğu, yüzeyden kabarık, düzgün sınırlı ve kazımakla uzaklaşmadığı saptanıyor. Öyküsünden, hastanın 4 sene önce böbrek nakli olduğu öğreniliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kronik hiperplastik kandidiyazis
B) Retiküler liken planus
C) Pemfigus vulgaris
D) Beyaz süngerimsi nevus
E) Friksiyonel hiperkeratoz

33. **Aşağıdakilerden hangisi yumuşak doku kalsifikasyonlarından biri değildir?**

A) Flebolit
B) Sistiserkozis
C) Miyositis ossifikans
D) Kondensing osteitis
E) Osteoma cutis

34. Yirmi sekiz yaşındaki erkek hasta 2 senedir tekrarlayan ağız içi aftları şikâyetiyle başvuruyor. Öyküsünden karın ve eklem ağrısı, kilo kaybı ve diyaresi olduğu öğreniliyor. Hastanın muayenesinde oral mukozada aftöz lezyonların yanı sıra alt bukkal sulkus mukozasında mukozal katlantılar, gingivitis, angüler şelitis ve granülomatöz şelitis saptanıyor.

Yukarıdaki tarif edilen hasta için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wegener granülomatozu
B) Crohn hastalığı
C) Behçet hastalığı
D) Sifiliz
E) Sistemik lupus eritematozus

35. Elli beş yaşındaki erkek hasta sol yanak bölgesinde dolgunluk ve ağrı şikâyetiyle başvuruyor. İntraoral muayenede total dişsizlik görülüyor. Panoramik radyografta sol maksiller sinüsü tamamen kaplayan radyoopasite dikkat çekiyor. İlgili bölgenin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi koronal kesitlerinde sol maksiller sinüsün tamamını kaplayan uniform radyoopasite ve sinüs ostiumunda tıkanıklık ile birlikte orbitanın inferior kortikal sınırında yıkım belirleniyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Retansiyon psödokist
B) Mukosel
C) Antrolit
D) Sinüzit



36.

I. Nazal septum
II. Servikal vertebra
III. Maksiller sinüs

Yukarıdakilerden hangileri panoramik radyografide hayalet görüntüye neden olur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

37. Radyografisi alınmak üzere radyoloji kliniğine gelen hastadan öncelikle yüzünü film reseptörüne çevirmesi daha sonra da başını öne doğru eğmesi isteniyor. Frontal bölgesi reseptöre temas eden hastadan ağzını açması isteniyor. Merkezî ışın reseptöre dik ve midsagital düzleme paralel olarak veriliyor.

Yukarıda tarif edilen radyografi tekniğinde öncelikle görüntülenmek istenen bölge hangisidir?

A) Maksiller sinüsler
B) Burun boşluğu
C) Mandibular kondiller
D) Koronoid çıkıntılar
E) Zigomatik arklar

38. Dijital görüntülemede kontrast çözünürlüğü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Bit derinliği
B) Voksel büyüklüğü
C) Piksel büyüklüğü
D) Milimetredeki çizgi çifti sayısı
E) Dedektör genişliği

39. Aşağıdakilerden hangisi radyasyondan korumada etkili değildir?

A) Film hızı
B) Obje-film mesafesi
C) Kolimasyon tipi
D) Filtrasyon
E) Film tutucu kullanılması



40.

I. Foton sayısının artması
II. Işının penetrasyon gücünün artması
III. Görüntünün densitesinin artması

Yukarıdakilerden hangileri röntgen cihazının kilovoltajı (kVp) artırıldığında görülebilecek etkilerdendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) I ve II
E) I ve III

41. Aşağıdakilerden hangisi periodontal hastalıklarda inflamasyonun çözünme aşamasında düzenleyici olarak rol alan endojen lipid proteinlerindendir?

A) Lizozim
B) Katepsin
C) Lökotrien
D) Resolvin
E) Bradikinin

42.

I. Keratinositlerin proliferasyonu çoğunlukla stratum bazale tabakasında olur.
II. Melanin salgılayan hücreler epitel içinde yer alır.
III. Merkel hücreleri epitel dokusunun derin tabakalarında, sinir sonlanmalarına komşu bölgelerde bulunurlar.
IV. Dentirik bir hücre olan Langerhans hücreleri makrofaj benzeri, mononükleer fagositik sisteme ait hücrelerdir.

Diş eti epiteli (gingival epitel) hücreleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) III ve IV
E) I, II, III ve IV

43. Dental biyofilmdeki ko-adezyonda rol oynayan, birçok oral bakteriye tutunma özelliğine sahip, erken ve geç kolonize olan mikroorganizmalar arasında köprü görevi gören anahtar mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) *Streptococcus mutans*
B) *Treponema denticola*
C) *Fusabacterium nucleatum*
D) *Prevotella intermedia*
E) *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

2022 DUS'ta 9 BÜYÜK BAŞARI

BAŞARI 1

2022 DUS'ta
8 ilk 10'da **kişi**
Tusdata ile kazandı
6 tanesi fakülte derecesi değil

BAŞARI 2

2022 DUS'ta
19 ilk 20'de **kişi**
Tusdata ile kazandı
15 tanesi fakülte derecesi değil

BAŞARI 3

2022 DUS'ta
85 ilk 100'de **kişi**
Tusdata ile kazandı
76 tanesi fakülte derecesi değil

BAŞARI 4

DUS kursu yaptığımız
30 ilden
27
il birincisi

DUSDATA'dan

BAŞARI 5

İL BİRİNCİLERİMİZ



BAŞARI 6

DUS 2022
ilk 100'deki
76
kursiyerimiz

FAKÜLTE DERECESİ DEĞİL

BAŞARI 7

DUS 2022
ilk 100'deki
47
kursiyerimiz

ÜÇ BÜYÜK İLDE DEĞİL

BAŞARI 8

DERS NOTLARIMIZ 2021 DUS'ta

DERS NOTLARIMIZ
Toplamda
116
Referans /120 Soru

REFERANS VERDİ

BAŞARI 9

14 DUS
12
BİRİNCİ

44.

I. Periodontal ligamentte inflamasyon
II. Yüksek frenulum
III. Antagonist diş eksikliği
IV. Hamilelik
V. Okluzal travma

Yukarıdaki durumlardan hangileri diş mobilitesinde artışa neden olur?

A) II ve V
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) I, II, IV ve V
E) I, III, IV ve V

45. **Aşağıdakilerden hangisinin nekrotizan gingivitisin klinik bulgularından biri olması en az olasıdır?**

A) Psödomembran formasyonu
B) Diş eti kanaması
C) Salivasyonda artış
D) Gingival deskuamasyon
E) Halitozis

46. Ağzında 28 diş olan, sigara içmeyen ve medikal bir problemi olmayan 70 yaşındaki kadın hastanın alt anterior ve üst molar bölgede yer alan toplam 6 dişinde interdental klinik ataşman kaybı 6 mm, sondlamada cep derinliği 7 mm ve radyografik alveoler kemik kaybı %50 olarak ölçülüyor. Klinik ve radyografik muayene sonrasında herhangi bir dişinin periodontal sebeple çekim endikasyonu olmadığı belirleniyor.

Güncel periodontal hastalıklar sınıflandırması (2017 EFP klavuzu) referans alındığında bu hasta için en uygun periodontitis teşhisi nedir?

A) Evre II, Derece A
B) Evre II, Derece B
C) Evre II, Derece C
D) Evre III, Derece B
E) Evre III, Derece C



47.

I. Monozigotik ve dizigotik ikizlerde, periodontitis dağılımını inceleyerek genetik ve çevresel faktörlerin etki oranının belirlenmesine yönelik "ikiz çalışmaları"
II. Aile içinde farklı jenerasyonların birlikte değerlendirilmesi ile ailesel geçişte resesif ve dominant yatkınlık genlerinin araştırıldığı "segregasyon analizi"
III. Periodontitisli ve sağlıklı bireylerde periodontitis patogenezinde rol oynayabileceği öngörülen aday genlerin incelenmesi için "aday gen analizi"

Yukarıdaki araştırma yöntemlerinden hangileri, periodontal hastalık patogenezinde genetik faktörlerin rolünü belirlemek için kullanılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

48. **Periodontal hastalık için klinik risk değerlendirmesi yapılırken kullanılan aşağıdaki parametre – kategori eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?**

A) Mikrobiyal dental plak – Risk faktörü
B) Cinsiyet – Risk determinantı
C) Stres – Risk belirteçleri (indicator)
D) Sondlamada kanama – Risk işaretleri (marker/predictor)
E) Geçirilmiş periodontal hastalık – Risk işaretleri marker/predictor)

49. **Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

A) Bariyer membranlar ve kemik greftleri kullanılabilir.
B) Periodontal ligament hücrelerinin, diş kökü yüzeyine tutunması amaçlanır.
C) Diş eti epitelinin, kök yüzeyine tutunmasının engellenmesi amaçlanır.
D) Diş eti bağ dokusunun, kök yüzeyine tutunmasının engellenmesi amaçlanır.
E) Aveoler kemik hücrelerinin, diş kökü yüzeyine tutunması amaçlanır.

50. Sadece sol üst 2. premolar ve 1. molar dişleri eksik olan hastada dişsiz alana komşu dişlerde restorasyon ve madde kaybı olmadığı görülüyor. Klinik ve radyografik değerlendirme sonucunda dişsiz alandaki alveoler kemiğin bukkolingual ve vertikal boyutlarının ve interark mesafelerin dental implant uygulaması için yeterli olduğu görülüyor. Dişsiz 2. premolar bölgesine 4 mm çaplı ve 1. molar bölgesine de 5 mm çaplı bir dental implant yerleştirilmesi planlanıyor.

Bu iki implantın meziodistal olarak ideal/uygun konumda yerleştirilebilmesi için sol üst bölgede bulunan 1. premolar diş ile 2. molar doğal dişler arasındaki meziodistal mesafe en az kaç mm olmalıdır?

A) 9
B) 15
C) 13
D) 11
E) 17

51. Çok sayıda süpernumere dişe aşağıdaki sendromlardan hangisinde en fazla rastlanır?

A) Kleidokraniyal displazi
B) Dudak-damak yarığı
C) Treacher Collins sendromu
D) Taurodontizm
E) Ektodermal displazi

52. Normal gelişim gösteren bir bireyde, nasolabial açı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Burun morfolojisinden etkilenir.
B) Subnasale-burun columellası ve subnasale-üst dudak teğetlerinin oluşturduğu açıdır.
C) Alt kesici dişlerin retroklinasyonundan ya da proklinasyonundan etkilenir.
D) Üst kesici dişlerin retroklinasyonundan ya da proklinasyonundan etkilenir.
E) Üst dudak konumundan etkilenir.

53. Aşağıdakilerden hangisi gömülü diş etiyolojisinden biri değildir?

A) Süpernumere diş
B) Yüksek frenulum bağlantısı
C) Odontoma
D) Travma
E) Dilaserasyon

54. Aşağıdaki kemiklerden hangisi en fazla postnatal büyüme potansiyeline sahiptir?

A) Mandibula
B) Maksilla
C) Temporal
D) Oksipital
E) Etmoid

55. Gövdesel diş hareketinde (translasyon) rotasyon merkezi nerede yer alır?

A) Apikal 1/3'te
B) Servikal 1/3'te
C) Sonsuzda
D) Direnç merkezi ile apeks arasında
E) Kronun insizal kenarında

56. Aşağıdakilerden hangisi molar intrüzyon yöntemi için kullanılmaz?

A) High-pull headgear
B) Fonksiyonel apareyler
C) İtici magnetler
D) Geçici ankraj üniteleri (mini vida ve plaklar)
E) Dikey intraoral intermaksiller elastikler

57. Sekiz yaşındaki kız hasta alt çenesinin önde olduğu şikâyetiyle getiriliyor. Klinik muayenede dişler tam kapanıştayken alt çenenin üst çeneye göre 5 mm önde olduğu saptanıyor. Yapılan sefalometrik değerlendirmede üst çenenin kafa kaidesine göre sagital konumunu gösteren açının normalden 5° az olduğu, alt çenenin sagital konumunu gösteren açının normal değerde olduğu ve vertikal yön konumunu gösteren açının ise azaldığı belirleniyor.

Bu hastaya uygulanabilecek en olası ortodontik tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortopedik çenelik
B) Sınıf 2 elastik
C) Yüz maskesi
D) Servikal headgear
E) Kamuflaj tedavisi

58.

I. Alt 1. molar dişlerde distale hareket
II. Alt 1. molar dişlerde ekstrüzyon
III. Alt keser dişlerde öne hareket

Yukarıdakilerden hangileri lip bumber apareyinin tedavi etkilerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

59. Aşağıdakilerden hangisi maksillaya uygulanan servikal headgear aygıtının etkilerinden değildir?

A) Maksiller keser dişlerin retrüzyonu
B) Maksiller molar dişlerin distalizasyonu
C) Maksiller molar dişlerin intrüzyonu
D) Maksilla büyümesinin sagital yönde kısıtlanması
E) Mandibulanın posterior rotasyonu



60.

I. Diastema miktarı
II. Kesicilerin labio-lingual eğimi
III. Dentisyonun erken veya geç dönemde olması

Üst orta hat diastemasına sahip bir bireyin ortodontik tedavi seçeneği kararında yukarıdaki kriterlerden hangileri belirleyicidir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

61. Semptomatik irreversibl pulpitis varlığında aşağıdaki dişlerin hangisinde ağrının kulağa yayılması en olasıdır?

A) Mandibular 2. molar
B) Maksiller 2. molar
C) Maksiller 1. molar
D) Mandibular 1. premolar
E) Maksiller 2. premolar

62.

I. Peritübüler dentin
II. Fibroblast
III. Kollajen fibril

Yaşlanmayla birlikte pulpa ve dentinde yukarıdakilerden hangilerinin miktarında artış beklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) Yalnız III **D)** I ve III
E) I, II ve III

Bu soruda, ifadelerin netliğinin sağlanması için orijinal soruda küçük modifikasyonlar yapılmıştır.

63.

I. Şiddetli renk değişikliğinin gözlendiği vakalarda sodyum perborat, hidrojen peroksit ile karıştırılabilir.
II. Kök kanal ağızlarına bariyer yerleştirilmesinin esas amacı renklenmenin tekrarlanmasını engellemektir.
III. Bu tedavilerin önemli bir komplikasyonu eksternal servikal kök rezorpsiyonunun gözlenmesidir.

Kök kanal tedavisi sonrasında koronal bölgede gözlenen renk değişikliğinin tedavisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) Yalnız III **D)** I ve II
E) I ve III

64.

I. Eğelerin sap kısımlarının renkleri
II. Eğelerin yatay kesitleri
III. Eğelerin koniklik miktarları
IV. Eğelerin uç çapları

ISO standartlarıyla yukarıdaki parametrelerden hangileri standartlaştırılmıştır?

A) I, II ve III **B)** II, III ve IV
C) I, II ve IV **D)** I, III ve IV
E) II ve III

65. Kök kanal tedavisinde sodyum hipokloritin etkinliğinin artırılması amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz?

A) Klorheksidin ile karıştırma
B) Konsantrasyonunu artırma
C) Uygulama süresini artırma
D) Aktivasyon yöntemlerini uygulama
E) Sıcaklığını artırma

66. Aşağıdakilerden hangisi lazerin endodontideki kullanım alanlarından biri değildir?

A) Pulpotomide kanama kontrolü
B) Kök kanal dezenfeksiyonu
C) Pulpa vitalite tespiti
D) Kök kanal medikamentlerinin uzaklaştırılması
E) Çalışma boyu tespiti

67. Dental pulpada aşağıdaki hücrelerden hangisi bulunmaz?

A) T lenfosit
B) Farklılaşmamış mezenkimal kök hücre
C) Fibroblast
D) Makrofaj
E) Kondrosit

68.

I. Çalışma boyunun tespitinde
II. Horizontal kök kırığının tespitinde
III. Ekstra kanal tespitinde

Tek köklü bir dişte yukarıdaki durumların hangilerinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanımı konvansiyonel radyografiye göre avantaj sağlamaktadır?

A) I ve II **B)** I ve III
C) II ve III **D)** Yalnız II
E) Yalnız III

69.

I. Klorheksidin ile karıştırılması antimikrobiyal etkinliğini azaltır.
II. *Enterococcus faecalise* karşı oldukça etkilidir.
III. Kök kanallarından uzaklaştırılması zordur.

Kanal içi medikasyonda kullanılan kalsiyum hidroksit ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) II ve III **D)** I ve III
E) I ve II

70. Aşağıdaki kök kanal dolgu yöntemlerinden hangisi internal kök rezorpsiyonu olan bir dişin tedavisinde tercih edilmemelidir?

A) Sıcak lateral kondenzasyon
B) Soğuk lateral kondenzasyon
C) Vertikal kondenzasyon
D) Termo mekanik
E) Termo plastik enjeksiyon

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DUSDATA'dan bir ilk daha...

DUS VAKA KAMPI

Soru ve Açıklamaları

ÇIKTI!

11 günde **VAKA KAMPI**'nda çözüldü.

Soruya yaklaşım teknikleri gözetilerek **SEÇENEKLER** analiz edildi.

3 Ciltte Toplam **2400** Vaka







TEMEL BİLİMLER

KLİNİK BİLİMLER

Kitap satın almak için:
www.klinisyen.com

Online Kamp satın almak için:
www.tusdataonline.com

71. Sol alt bölgede özellikle yemeklerden sonra ağrı şikâyetiyle getirilen 9 yaşındaki kız çocuğunun ağız içi muayenesinde 75 no'lu dişinde yaygın bir çürüğe rastlanırken, periodontal dokuların sağlıklı olduğu gözleniyor. Periapikal radyografında derin dentin çürüğü dışında herhangi bir patolojiye rastlanmıyor. Lokal anestezi altında tedavisine başlanan hastanın 75 no'lu dişinin çürük kavitesinin dış sınırları yüksek hızlı el aletine takılan elmas frezle oluşturuluyor. Yumuşak çürük dentin dokusu ekskavatör ve yavaş dönen el aletleriyle periferden merkeze doğru temizleniyor.

Bu tabloda tarif edilen operatif teşhis kriterlerine göre;

I. Kavite preparasyonu sırasında oluşan iğne ucu büyüklüğünde bir çürüklü perforasyon varlığında kanama kontrol altına alınırsa direkt pulpa kaplaması yapılır.
II. Kavite preparasyonu sırasında oluşan iğne ucundan büyük bir çürüklü perforasyon varlığında kanama miktarına ve perforasyon boyutuna bakılmaksızın pulpa odasının tavanı kaldırılarak kron pulpası çıkarılır. Kanal ağızlarındaki kanama kontrol altına alınabilirse pulpotomi işlemi uygulanır.
III. Kavite preparasyonu sırasında birden fazla çürüklü perforasyon bölgesi oluştuğunda, kron pulpasında hiç kanama olmaması durumunda pulpa odasının tavanı kaldırılarak kron pulpası çıkarılır. Kanal ağızlarındaki kanama kontrol altına alınarak pulpotomi işlemi uygulanır.
IV. Kavite preparasyonu sırasında oluşan çürüklü perforasyon bölgesinde püy tespit edilirse pulpektomi işlemi uygulanır.

Yukarıdaki tedavi yaklaşımlarından hangileri uygundur?

A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
E) II ve III

72. **Aşağıdaki anomalilerden hangisi diş gelişim evrelerinden morfodiferansiasyon aşamasında meydana gelen bir problem sonucu oluşur?**

A) Süpernumere diş
B) Mikrodonti
C) Kompleks odontoma
D) Mine hipoplazisi
E) Rejnolel odontodisplazi

73. Dil, damak, diş eti ve dudak çevresinde veziküler lezyonlar ve boğaz ağrısı nedeniyle getirilen 4 yaşındaki kız çocuğun anamnezinden yüksek ateş ve iştahsızlık şikâyetleri de olduğu öğreniliyor. Klinik muayenede aynı zamanda avuç içlerinde de benzer lezyonlar olduğu görülüyor.

Sistemik ve ağız içi bulguları bir arada görülen bu çocukluk hastalığının aşağıdakilerden hangisi olması <u>en olasıdır</u>?

A) Eritema multiforme
B) Aftöz stomatit
C) Enfeksiyöz mononükleozis
D) El-ayak-ağız hastalığı
E) Varisella

74.

- Otozomal resesif geçiş gösterir.
- Mine hipoplazisi görülür.
- Tükürük kalsiyum ve pH düzeyleri yüksektir.
- Solunum yolu hastalıkları ve gastrointestinal problemlerle karakterizedir.
- Genel anestezi altında hastanın tedavi edilmesi risklidir.

Bu tabloda tanımlanan hastalığın aşağıdakilerden hangisi olması <u>en olasıdır</u>?

A) Crohn hastalığı
B) Fibröz displazi
C) Çölyak hastalığı
D) Kostmann sendromu
E) Kistik fibrozis

75. Sıkıntılı, uzun süren, zor bir doğum sonrasında dünyaya gelen çocuğun dişlerinde fetal distresin yol açtığı gelişimsel mine defektlerinin görülmesi beklenir.

Bu durumda aşağıdaki dişlerden hangisinin etkilenmesi <u>en olasıdır</u>?

A) 36
B) 27
C) 15
D) 34
E) 23

76.

I. Daha ince dentin köprüsü oluşturması
II. Histolojik olarak doku cevabının daha iyi olması
III. Çözünürlüğünün daha fazla olması
IV. Örtücülüğünün daha fazla olması

Yukarıdakilerden hangileri mineral trioksit agregat'ın kalsiyum hidroksite göre avantajlarındandır?

A) I ve IV
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
E) I ve III

77. **Trombositopenili bir çocukta süt dişi çekimi gibi minör bir cerrahi uygulaması yapabilmek için platelet sayısının <u>en az</u> kaç olması gerekmektedir?**

A) $20x10^9/L$
B) $25x10^9/L$
C) $30x10^9/L$
D) $35x10^9/L$
E) $50x10^9/L$

Bu soruda, ifadelerin netliğinin sağlanması için orijinal soruda küçük modifikasyonlar yapılmıştır.

DUS DATA
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Ekim 2022
İlk 10'da **8**
İlk 20'de **19**
İlk 50'de **44**
İlk 100'de **85**
kişi

İlk 100'de ama fakülte derecesiyle* mezun olmayan kursiyerlerimizin sayısı

*Yeni mezun (ilk sınavı) veya intern olup ilk 5 içinde olanlar fakülte derecesi kabul edilmiştir.

Ekim 2022'de
76
kursiyerimiz
fakülte derecesi değil

Adı Soyadı	Puan	Sıra
Derya PINAR	71,601	2
Mümine GÖKYER	71,060	4
Aybüke ÖZYALIN	70,520	5
Hüseyin EFE	70,520	5
Elif ÇELİK	70,412	7
Sadık ARSLAN	70,303	8
Eren KAYA	69,655	12
Gayenur SARI	69,655	12
Kübra ÇEVİK	69,655	12
Süleyman ŞENTÜRK	69,655	12
Beyza MARAŞLI	69,547	17
Esra Nur KURT	69,547	17
Osman Bahadır TOPCU	69,439	19
Ayşenur ÇALIŞKAN	69,439	19
Funda ERMİŞ	69,439	19
Eray ERCAN	69,331	23
Arife GÜRBÜZ	69,331	23
Zeynep G. ŞANOĞLU	69,331	23
Sevgi KOÇAL	69,222	26
Aslı ÇEPNİ	69,006	27
Kevser Nur KÜTÜK	69,006	27
Merve ARIKBOĞA	69,006	27
Metin Can KIV	69,006	27
Leyla YILMAZ	68,898	31
Büşra ÇELİK	68,898	31

Adı Soyadı	Puan	Sıra
Sıla TAYYİPOĞLU	68,898	31
Salih ER	68,898	31
Saliha Nur KESKİN	68,790	35
İlknur Ezgi DUMAN	68,790	35
Cihan BALTACI	68,682	39
Ozan ÖZER	68,682	39
Helin YILMAZ	68,574	42
Berkay AKPINAR	68,574	42
Osman ERDEN	68,466	45
Özgür DAĞAL	68,466	45
Begüm TUĞÇE BULUT	68,358	48
Elif AYBALA TUNCER	68,358	48
Utku Ongun TÜRKMEN	68,358	48
Sedanur ÜNAL	68,142	51
Oğuzhan BÜYÜKEKEN	68,142	51
Gül EMREN	68,142	51
M. Enes KIRANDİ	68,033	54
Ceyda TOSUN	68,033	54
Şevval KARAMAN	68,033	54
Fatma BAKAR	68,033	54
Talha Enes ÖZBEK	67,944	61
Tayyip BİÇER	67,925	62
Duygu ESKİN	67,925	62
Ebru TEKİN	67,925	62
Ezgi DEMİRBAŞ	67,925	62

Adı Soyadı	Puan	Sıra
Ahmet İŞBİLİR	67,817	70
Hüseyin KAYA	67,817	70
Müslüm BAŞ	67,709	75
Merve ZEYBEK	67,709	75
Gizem AKOVA	67,709	75
İrem ÇALIŞKAN	67,601	79
Kübra ERGEN	67,601	79
Recep Tayyip KAYNAK	67,601	79
Şule ŞAHİN	67,601	79
Ahmet Tunahan TOK	67,493	83
Kubilay ŞENGÜL	67,493	83
Salih OFLİOĞLU	67,493	83
Tunay ALVAN	67,493	83
Bengü ÖĞRETİR	67,385	88
Kardelen DEMİREL	67,385	88
Aleyna DİLEKÇİ	67,277	91
Beliz İlke ÖZDEMİR	67,277	91
Burcu Aygün AKBULUT	67,277	91
Cihat GÜNER	67,277	91
Deniz DANIŞ	67,169	97
Berk AKKOCA	67,169	97
Mustafa ÖDEN	67,169	97
Zeynep AKPINAR	67,169	97
Asena ADAKLI	67,169	97
Emre BALÇAK	67,169	97
C***** K*****	67,169	97

İlk 100'de ama üç büyük ilde olmayan kursiyerlerimizin sayısı

Adı Soyadı	Şube	Puan	Sıra
Halime ERTÜRK	AYDIN	71,384	3
Mümine GÖKYER	KONYA	71,060	4
Aybüke ÖZYALIN	MALATYA	70,520	5
Hüseyin EFE	ISPARTA	70,520	5
Elmas LİV	ZONGULDAK	70,195	9
Beyza MARAŞLI	KAYSERİ	69,547	17
Esra Nur KURT	DENİZLİ	69,547	17
Osman Bahadır TOPCU	KAYSERİ	69,439	19
Funda ERMİŞ	DENİZLİ	69,439	19
Eray ERCAN	UŞAK	69,331	23
Sevgi KOÇAL	ISPARTA	69,222	26
Merve ARIKBOĞA	MALATYA	69,006	27
Leyla YILMAZ	KONYA	68,898	31
Büşra ÇELİK	ISPARTA	68,898	31
Salih ER	TRABZON	68,898	31
Cihan BALTACI	ERZURUM	68,682	39
Özlem Su KAYA	KOCAELİ	68,682	39
Miraç KANAT	ADANA	68,574	42
Helin YILMAZ	DENİZLİ	68,574	42
Berkay AKPINAR	ISPARTA	68,574	42
Özgür DAĞAL	TOKAT	68,466	45
Elif Aybala TUNCER	ANTALYA	68,358	48
Utku Ongun TÜRKMEN	ISPARTA	68,358	48
Sedanur ÜNAL	KAYSERİ	68,142	51

Adı Soyadı	Şube	Puan	Sıra
Oğuzhan BÜYÜKEKEN	KONYA	68,142	51
Gül EMREN	KOCAELİ	68,142	51
M. Enes KIRANDİ	TRABZON	68,033	54
Talha Enes ÖZBEK	KOCAELİ	67,944	61
Tayyip BİÇER	SAMSUN	67,925	62
Duygu ESKİN	ISPARTA	67,925	62
Ezgi DEMİRBAŞ	ANTALYA	67,925	62
Ezgi VENEDİK	ANTALYA	67,925	62
Ahmet İŞBİLİR	ESKİŞEHİR	67,817	70
Hüseyin KAYA	ISPARTA	67,817	70
Şerife KOŞAR	ESKİŞEHİR	67,817	70
Müslüm BAŞ	ANTALYA	67,709	75
İrem ÇALIŞKAN	ERZURUM	67,601	79
Recep Tayyip KAYNAK	KONYA	67,601	79
Ahmet Tunahan TOK	ZONGULDAK	67,493	83
Kubilay ŞENGÜL	TRABZON	67,493	83
Tunay ALVAN	ESKİŞEHİR	67,493	83
Bengü ÖĞRETİR	ERZURUM	67,385	88
Aleyna DİLEKÇİ	ANTALYA	67,277	91
Burcu Aygün AKBULUT	ORDU	67,277	91
Cihat GÜNER	KOCAELİ	67,277	91
Deniz DANIŞ	KAYSERİ	67,169	97
Berk AKKOCA	ADANA	67,169	97

Ekim 2022'de
47
kursiyerimiz
üç büyük ilde değil

78. Daimî dişlenme dönemiyle karşılaştırıldığında süt dişlenme dönemindeki çocukların diş çevre dokularıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Alveol kemik trabekülleri daha seyrektir.
B) Periodontal ligament genişliği daha fazladır.
C) Sement daha incedir.
D) Lamina dura daha kalındır.
E) Arayüzlerde diş eti papili daha kalındır.

79. Travma sonucu üst orta keser dişlerinde avülsiyon yaralanması oluşan 13 yaşındaki çocuk hastada, replantasyon tedavi sürecinde kullanılması en uygun antibiyotik grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Penisilinler
B) Sefalosporinler
C) Glikopeptidler
D) Makrolidler
E) Tetrasiklinler

80.

I. Ortodontik braket uygulaması
II. Fissür örtücü uygulaması
III. Paslanmaz çelik kron uygulaması
IV. İntraligamenter anestezi uygulaması
V. Rubber dam uygulaması

Enfektif endokardit riski bulunan bir çocuk hastada yukarıdaki uygulamaların hangilerinde işlem öncesinde antibiyotik profilaksisi uygulanmalıdır?

A) I ve II
B) I ve IV
C) III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, III, IV ve V



Detaylı bilgi için: www.dusdata.com adresini takip ediniz.

TEMEL BİLİMLER CEVAP ANAHTARI	
1. A	21. D
2. D	22. B
3. E	23. E
4. A	24. D
5. C	25. D
6. A	26. C
7. E	27. A
8. B	28. D
9. B	29. E
10. C	30. B
11. A	31. A
12. E	32. C
13. A	33. B
14. B	34. B
15. C	35. D
16. B	36. A
17. A	37. C
18. C	38. E
19. D	39. D
20. C	40. B

KLİNİK BİLİMLER CEVAP ANAHTARI			
1. C	21. D	41. D	61. A
2. A	22. C	42. E	62. D
3. B	23. B	43. C	63. E
4. A	24. E	44. E	64. D
5. B	25. A	45. D	65. A
6. B	26. C	46. D	66. E
7. C	27. D	47. E	67. E
8. A	28. A	48. C	68. C
9. D	29. C	49. E	69. E
10. E	30. A	50. B	70. B
11. C	31. E	51. A	71. D
12. B	32. A	52. C	72. B
13. C	33. D	53. B	73. D
14. D	34. B	54. A	74. E
15. A	35. B	55. C	75. A
16. B	36. B	56. E	76. D
17. E	37. C	57. C	77. E
18. D	38. A	58. E	78. D
19. C	39. B	59. C	79. E
20. B	40. C	60. E	80. C

DUS DATA
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

e-DUSDATA

MOBİL UYGULAMA


Mevcut dönem kursiyerimize ÜCRETSİZ

1 Hedeflerim
(Kronometre vs.)

2 Spotlarla Hızlı Tekrar
(15.809 spot)

3 Deneme Sınavları
(18 Tam Deneme
16 Branş Denemesi)

4 Videolar
(750'den fazla video
263 Saat)



5 Online Soru Çöz
(25.909 soru)

6 Tüm DUS Soruları
(1.560 soru)

7 YÖKDİL - TIPDİL
(60 Saat video)

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Satın almak için:

tusdataonline.com