DUS DATA®

DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sonbahar 2023 DUS

Orijinal Sorular

2021



Dt. Batuhan TÜMEN
Puanı: 72.318

İlk 10'da	İlk 100'de
6 kişi	63 kişi

İlkbahar 2023



Dr. Şeyma MALİ
Puanı: 72.246

İlk 10'da	İlk 100'de
8 kişi	79 kişi

Sonbahar 2023



Dr. Emine Hazan AKÇADOĞAN
Puanı: 75.042

İlk 10'da	İlk 100'de
9 kişi	72 kişi

DUSDATA ile kazandı...

DUS DATA
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DUS notlarımız KAÇ SORU yaptırdı?

- Herkes *"en çok soruya biz referans olduk"* diye iddia ediyor.
- Her iddia İSPAT ister. İddia ile ispat UYUMLU olmalıdır...

Şampiyonların Notu
113
soruya referans verdi



DUS 1.'si :105,75 net
DUS 10.'su :99,5 net
DUS 50.'si :94 net
DUS 100.'sü :91,75 net

Hızlı Tekrar Notlarımız
98
soruya referans verdi



Buyrun İDDİA ile İSPAT'ın MÜKEMMEL UYUMU

İlk 100'de
72
kişi

İlk 200'de
142
kişi

İlk 300'de
226
kişi

2023 SONBAHAR DUS

TEMEL BİLİMLER TESTİ

1. Vertebrae cervicales'in hangisinin processus spinosus'u diğerlerine göre daha belirgin olup kolaylıkla palpe edilebilir?

A) CI
B) CIII
C) CV
D) CVI
E) CVII

2. Ligamentum vocale'ler aşağıdaki hangi iki kıkırdak arasında uzanır?

A) Cartilago thyroidea – Cartilago cuneiformis
B) Cartilago thyroidea – Cartilago arytenoidea
C) Cartilago cricoidea – Cartilago arytenoidea
D) Cartilago cricoidea – Cartilago cuneiformis
E) Cartilago cricoidea – Cartilago epiglottica

3. Molar ve premolar dişlerin oklüzal yüzeylerinde, marginal sırtların mezial ve distalinde yer alan içbükey alanlara ne ad verilir?

A) Gelişimsel oluk
B) Üçgensel fossa
C) Pit
D) Fissür
E) Lob

4.

I. Musculus palatopharyngeus
II. Musculus salpingopharyngeus
III. Musculus palatoglossus
IV. Musculus constrictor pharyngis superior

Tonsilla palatina yukarıdaki kaslardan hangi ikisi arasında bulunur?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

5. Yüze gelen bir darbe sonrası alt göz kapağından üst dudağa ve burun dış yanına uzanan alanda disestezi tarif eden hastada aşağıdaki sinirlerden hangisinin etkilenmiş olması en olasıdır?

A) Nervus buccalis
B) Nervus zygomaticus
C) Nervus infraorbitalis
D) Nervus facialis
E) Nervus auriculotemporalis


6. Yanak mukozasının duyusunu alan nervus buccalis aşağıdakilerden hangisinin dalıdır?

A) Nervus maxillaris
B) Nervus mandibularis
C) Nervus massetericus
D) Nervus mentalis
E) Nervus facialis

7. Epifiz büyüme plağında, epifize en uzak alan aşağıdakilerden hangisidir?


A) Rezorpsiyon (ossifikasyon) alanı
B) Kalsifiye kıkırdak alanı
C) Hipertrofi alanı
D) Proliferasyon alanı
E) Rezerv kıkırdak alanı

8.



Dilden alınan bir kesite ait yukarıdaki mikroskopik görüntüde ok ile işaretli yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fungiform papilla
B) Dental papilla
C) Filiform papilla
D) Folyat papilla
E) Sirkumvallat papilla



9. Ameloblastlar, diş gelişimi sırasında oluşan yapıların hangisinden köken alır?

A) Epitelyal kök kılıfı
B) İç dental epitel
C) Dental kese
D) Stellat retikulum
E) Dental papilla

10. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan her iki organda da venöz portal sistem bulunur?


A) Duodenum – Pankreas
B) Karaciğer – Paratiroid
C) Hipofiz – Pankreas
D) Karaciğer – Hipofiz
E) Duodenum – Paratiroid

11. Tükürük sekresyonunun uyarılmadığı düşük sekresyon hızı olduğu dönemde ağız içindeki tükürük içeriği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Na^+ miktarı artar.
B) Cl^- miktarı artar.
C) Ph değeri azalır.
D) K^+ miktarı azalır.
E) Enzim aktivitesi artar.

12. Aşağıdakilerden hangisi tiroid hormonunun etkisine bağlı olarak artmaz?

A) Glikoneogenez
B) Na^+ /K^+ ATpaz aktivitesi
C) Plazma serbest yağ asidi konsantrasyonu
D) Plazma kolesterol konsantrasyonu
E) Oksijen tüketimi



13. Aşağıdakilerden hangisi tip 1 iskelete kası liflerinin özelliklerinden biridir?

A) ATP üretiminde temel kaynak glikolizdir.
B) Miyozin ATPaz aktivitesi yüksektir.
C) Çabuk yorulurlar.
D) Miyoglobin miktarı düşüktür.
E) Mitokondri sayısı fazladır.

14. Aşağıdaki enzimlerden hangisi inaktif formdaki pankreatik proteolitik proenzimleri aktif forma dönüştürür?

A) Kimotripsin
B) Tripsin
C) Elastaz
D) Karboksipeptidaz
E) Lipaz

15. Aşağıdakilerden hangisi Na^+/K^+ ATPaz pompasının özelliklerinden değildir?

A) Aktif taşıma yapar.
B) Elektrojenik bir pompadır.
C) Hücre için Na^+ yoğunluğunu düşük tutmaya çalışır.
D) Ouabain ile inhibe edilebilir.
E) Sekonder aktif transporta örnektir.

16. Normal bir bireyde beyin omurilik sıvısı yapımının büyük bölümü aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?

A) Koroid pleksuslar
B) Ventriküllerin ependimal yüzeyleri
C) Akuaduktus Sylvius
D) Sisterna magna
E) Araknoid villi

17. Aşağıdaki amino asitlerden hangisi safra tuzu yapısında bulunan taurinin sentezinde prekürsör olarak kullanılır?

A) Glisin
B) Sistein
C) Alanin
D) Valin
E) Lösin

18. İnsülin etkisini güçlendirerek glukoz metabolizmasının düzenlenmesine katkı sağlayan eser element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selenyum
B) Mangan
C) Krom
D) Flor
E) Molibden

19. Aşağıdakilerden hangisi, yağ asidi sentezi için gereken redüktif (indirgen) koenzimleri üreten enzimlerden biridir?

A) Malik enzim
B) Pirüvat dehidrogenaz
C) Asetil-KoA karboksilaz
D) Sitrat liyaz
E) Süksinat dehidrogenaz

Sonbahar 2023

İlk 100'de ama fakülte derecesiyle* mezun olmayan kursiyerlerimizin sayısı

*Yeni mezun (ilk sınavı) veya intern olup ilk 3 içinde olanlar fakülte derecesi kabul edilmiştir.

Adı Soyadı	Puan	Sıra
Emine Hazan AKÇADOĞAN	75,042	1
Yusuf Bekir KARA	73,201	3
Oğuzhan ERDEM	72,955	4
Arda TOPTAŞ	72,218	7
Selin ÖZMAÇİN	72,096	8
Ersagun KARA	71,973	9
Sinem KAYABAŞ	71,605	12
Zehra REKALI	71,605	12
Mertkan ZEYREKOĞLU	71,605	12
B***** H***** G*****	71,605	12
Evrim ÖZTÜRK	71,236	18
Aybüke ERDOĞAN	71,236	18
Veli Can KOÇYİĞİTOĞLU	71,113	22
Sinem UYANIK	71,113	22
Mert Osman DEMİRCİ	71,113	22
Pelin KURT	70,991	27
Nursena ŞAHİN	70,868	28
Halimcan KOŞAR	70,868	28
Gizem ÜÇÜNCÜOĞLU	70,745	32
Ahmet Emre TEMELCİ	70,500	33
Bengisu GÜRSOY	70,377	34
Umut KIVILCIM	69,886	37
Cansu VAROL	69,886	37
Kenan ÖZTAN	69,886	37
Ahsen ÖZTÜRK	69,763	40
Emine AYDIN	69,763	40
Dilara GEZGİN ÇAKMAK	69,640	43
İsmail KOCAKAHYA	69,517	46
Orhan Gazi DEMİR	69,272	48
Muhammed Furkan AYDIN	69,149	50
Şeyma YILDIZ	69,149	50
Ömer GÜL	69,149	50
Simge BURGUCU	69,149	50

DUS DATA®
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sonbahar 2023'de

65

kursiyerimiz

fakülte derecesi değil

Adı Soyadı	Puan	Sıra
Barkın ATABEY	69,149	50
Ervanur ÇALIŞKAN	69,149	50
Dilan ATEŞ	69,149	50
Osman KOÇ	69,149	50
Hasan Ersin ÖZKAYA	69,026	59
Buse KELEMENÇE	69,026	59
Ayça ÖZSOY	69,026	59
Ayşe Azra ÖZDEMİR	69,026	59
Sema Nur CANER	68,904	66
Tuğçe ÇEVİK	68,904	66
Ceren Nesrin EŞBERK	68,658	72
Elif AKSOY	68,658	72
Selim KESMEN	68,658	72
Sude ERDEN	68,658	72
Aysime Yağmur ULUS	68,658	72
Fatma KAYA	68,658	72
Beyhan BİRCAN	68,658	72
Bayram AYGÜN	68,535	81
Şule ERDEN	68,535	81
Elif Ece IŞIK	68,535	81
Ezgi AKTAŞ	68,535	81
Rana KESER	68,535	81
Asuman SARIALTIN	68,535	81
Furkan TUNÇER	68,535	81
Filiz Göksel CEYLAN	68,412	90
Sevdenur AYDOĞUŞ	68,412	90
Artun YANGIN	68,290	93
Ceren YEL	68,290	93
Gözde Nur KARAHAN	68,290	93
Merve İSLAMOĞLU	68,247	96
İbrahim Halil ERGÜL	68,167	97
Necati NALÇACI	68,167	97

İlk 100'de ama üç büyük ilde olmayan kursiyerlerimizin sayısı

Adı Soyadı	Puan	Sıra	Şube
E. Hazan AKÇADOĞAN	75,042	1	Zonguldak
Ersagun KARA	71,973	9	Online
Büşra UYSAL	71,850	10	Isparta
Öykü Beyhan YILMAZ	71,236	18	Kocaeli
Evrim ÖZTÜRK	71,236	18	Aydın
Sinem UYANIK	71,113	22	Bolu
Ramazan TAMER	70,868	28	Hatay
Halimcan KOŞAR	70,868	28	Online
Gizem ÜÇÜNCÜOĞLU	70,745	32	Ordu
Kenan ÖZTAN	69,886	37	Online
Ahsen ÖZTÜRK	69,763	40	Konya
Emine AYDIN	69,763	40	Kayseri
İsmail KOCAKAHYA	69,517	46	Kocaeli
M. Furkan AYDIN	69,149	50	Denizli
Şeyma YILDIZ	69,149	50	Online
Barkın ATABEY	69,149	50	Aydın
Dilan ATEŞ	69,149	50	Online
H. Ersin ÖZKAYA	69,026	59	Online

Adı Soyadı	Puan	Sıra	Şube
Sema Nur CANER	68,904	66	Kayseri
Elif AKSOY	68,658	72	Antalya
Selim KESMEN	68,658	72	Antalya
Sude ERDEN	68,658	72	Kocaeli
Fatma KAYA	68,658	72	Gaziantep
Beyhan BİRCAN	68,658	72	Denizli
Bayram AYGÜN	68,535	81	Trabzon
Şule ERDEN	68,535	81	Online
Elif Ece IŞIK	68,535	81	Online
Ezgi AKTAŞ	68,535	81	Erzurum
Rana KESER	68,535	81	Samsun
Furkan TUNÇER	68,535	81	Isparta
Sevdenur AYDOĞUŞ	68,412	90	Trabzon
Artun YANGIN	68,290	93	Online
Mine TÜRK	68,167	97	Aydın
İbrahim Halil ERGÜL	68,167	97	Online
Necati NALÇACI	68,167	97	Online

Sonbahar 2023'de

35

kursiyerimiz

üç büyük ilde değil

20. Akut pankreatitte kan düzeyinde artış gösteren ve tanı değeri olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kreatin kinaz
B) Amilaz
C) Aldolaz
D) Alanin aminotransferaz
E) Laktat dehidrogenaz

21. İnsülin, aşağıdaki enzimlerden hangisinin gen ekspresyonunda artışa neden olmaz?

A) Fosfofruktokinaz-I
B) Pirüvat kinaz
C) Fosfoenolpirüvat karboksikinaz
D) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
E) Asetil-KoA karboksilaz

22. Aşağıdakilerden hangisi pirüvat dehidrogenaz enzim kompleksinin yapısında yer almaz?

A) Tiamin
B) Ribofilavin
C) Niasin
D) Biotin
E) Pantotenik asit

23. Aşağıdakilerden hangisi radyofrekans enerji kullanılarak elde edilen gaz/buhar ile yapılan kimyasal sterilizasyon yöntemlerinden biridir?

A) Etilen oksit sterilizasyonu
B) Perasetik asit sterilizasyonu
C) Hidrojen peroksit plazma sterilizasyonu
D) Glutaraldehit sterilizasyonu
E) Basınçlı buhar ile sterilizasyon



24. Aşağıdaki bakterilerden hangisinde aksiyal flaman (endoflajella) bulunur?

A) *Bartonella quintana*
B) *Borrelia burgdorferi*
C) *Campylobacter jejuni*
D) *Tropheryma whipplei*
E) *Rickettsia prowazekii*

25. Servikofasiyal aktinomikoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etkeni gram-pozitif anaerobik basildir.
B) Aktinomikozların en sık görülen formudur.
C) İrin içinde sülfür granülleri bulunur.
D) Cerrahi drenaj ve 6-12 ay penisilin tedavisi uygulanması gerekir.
E) Etken sıklıkla çevreden bulaşır.

26. Aşağıdaki hastalıkların hangisinden Epstein-Barr virusun sorumlu olması en az olasıdır?

A) Enfeksiyöz mononükleoz
B) Eritema enfeksiyozum
C) Burkitt lenfoma
D) Nazofarengial karsinoma
E) Tüylü oral lökoplaki

27. Flukonazole çok yüksek oranda dirençli olması yanında vorikonazol, amfoterisin B ve ekinokandinlere de dirençli olabilen, hastanelerde salgın yapma potansiyeli diğerlerine göre daha yüksek olan *Candida* türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) *Candida auris*
B) *Candida albicans*
C) *Candida krusei*
D) *Candida tropicalis*
E) *Candida glabrata*

28. Özellikle küçük çocuklarda görülen; trompositopeni ve egzama yanında, serumda artmış IgA ve IgE seviyelerine karşın polisakkarit antijenlere karşı IgM üretiminde defekt olması nedeniyle kapsüllü bakterilere karşı savunmada zayıflığa neden olan, X-zincir resesif immün yetmezlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Job sendromu
B) Wiskott-Aldrich sendromu
C) MHC sınıf II yetersizliği
D) Kronik granülomatoz hastalığı
E) DiGeorge sendromu

29. Elli beş yaşındaki erkek hasta, sol parotis bezi yerleşimli 4 cm çaplı palpabl kitle nedeniyle başvuruyor. Otuz yıllık sigara içme öyküsü olan hasta opere ediliyor. Kitlenin histolojik incelemesinde; lenfoid stromalı, oksifilik, çift sıralı neoplastik epitelin döşediği kistik alanlar görülüyor.

Bu kitle için en olası tanı aşağıdakileden hangisidir?

A) Pleomorfik adenom
B) Warthin tümörü
C) Mukoepidermoid karsinom
D) Burkitt lenfoma
E) Adenoid kistik karsinom

30. Klinik bulgusu olmayan hastanın panoromik radyografisinde mandibular premolar alanda multiloküler radyolusent görüntü saptanıyor. Klinik muayenede dişlerin vital olduğu belirleniyor. Histopatolojik inceleme sonucunda olgu, yer yer daha kalın epitelyal plaklar da içeren ince skuamöz epitel ile döşeli, epitelin bazı alanlarında glikojenden zengin berrak hücre grupları izlenen çok kompartmanlı kist olarak rapor ediliyor.

Bu kist için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Odontojenik keratokist
B) Rezidüel kist
C) Anevrizmal kemik kisti
D) Botryoid odontojenik kist
E) Dentigeröz kist

31.

I. Membran fosfolipidlerinde bulunan araşidonik asit metabolitlerindendir.
II. Vazokonstriksiyondan sorumludur.
III. Ateş patogenezinde rol oynar.

Prostaglandin E2 ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

32. **Oral mukozada saptanan bir lezyon ile ilgili patoloji raporunda yer alan "karsinoma in-situ" tanısı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?**

A) Epitelde hiperparakeratoz bulunduğunu
B) Epitelin metaplastik olduğunu
C) Malign epitel hücrelerinin submukozaya invazyon yaptığını
D) Epitelin tüm katlarını tutan şiddetli displazi olduğunu
E) Damar içinde karsinom hücrelerinin bulunduğunu

33. **Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisinin geliştirilmesi sırasında Faz-I çalışmalarına sağlıklı gönüllüler yerine hasta gönüllüler dâhil edilir?**

A) Antihipertansif ilaçlar
B) Antidiyabetik ilaçlar
C) Antineoplastik ilaçlar
D) Psikoaktif ilaçlar
E) Analjezik ilaçlar

34. **Penisilin alerjisi hikâyesi olan bir hastada aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin tercih edilmesi en az uygundur?**

A) Klindamisin
B) Vankomisin
C) Sefalosporin
D) Azitromisin
E) Eritromisin

35. **Aşağıdakilerden hangisi gentamisinin en belirgin yan etkisidir?**

A) Nefrotoksisite
B) Hepatotoksisite
C) Üriner inkontinans
D) Postural hipotansiyon
E) Psikotik arazlar

36. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bir opioid reseptör antagonistidir?**

A) Nalokson
B) Morfin
C) Papaverin
D) Tebain
E) Kodein

37.

I. Fosfolipid
II. Kolesterol
III. Glikolipid

Yukarıdakilerden hangileri hayvan hücresi membranı yapısında bulunan moleküllerdendir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) Yalnız III **D)** I ve III
E) I, II ve III

38. **Aşağıdakilerden hangisi ökaryotlarda RNA polimeraz I tarafından sentezlenir?**

A) mRNA **B)** miRNA
C) SnRNA **D)** tRNA
E) rRNA

39. **Aşağıdakilerden hangisi mRNA'nın olgunlaşma sürecinde gerçekleşen değişikliklerden biri değildir?**

A) Poli-adenin kuyruğu takılması
B) 7-metil guanin şapka takılması
C) İntronların kesilerek çıkarılması
D) Eksonların birleştirilmesi
E) mRNA'nın miRNA ile etkileşmesi

40. **RNA'dan DNA sentezleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Topoizomeraz
B) DNA polimeraz
C) Ligaz
D) Revers transkriptaz
E) RNA polimeraz



2023 SONBAHAR DUS

KLİNİK BİLİMLER TESTİ

1.

I. Sekonder dentin
II. Manto dentin
III. Reperatif dentin

Yukarıdakilerden hangileri primer odontoblastlar tarafından üretilen dentin tiplerinden biri değildir?

A) I ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I, II ve III

2. Aşağıdaki bakterilerden hangisi yenidoğanın oral mikroflorasında ilk yerleşen öncü türlerden biridir?

A) *Streptococcus salivarius*
B) *Streptococcus sanguinis*
C) *Fusobacterium nucleatum*
D) *Actinomyces naeslundii*
E) *Streptococcus gordonii*

3. Otuz dokuz yaşındaki erkek hasta, dişlerindeki aşınma ve hassasiyet nedenleriyle başvuruyor. Klinik muayenesinde, diş aşınmalarının özellikle ön dişlerin palatinal bölgelerinde olduğu tespit ediliyor. Anamnezinden gastroözofageal reflü hastalığına bağlı gelişen sistematik şikâyetlerinin olduğu öğreniliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Patolojik atrizyon
B) Fizyolojik atrizyon
C) Abfraksiyon
D) Erozyon
E) Abrazyon

4. Aşağıdakilerden hangisi tükürükte bulunmaz?

A) Lipid
B) Üre
C) Protein
D) IgE
E) Statherin



5. İndirekt kompozit restorasyonların simantasyonu sırasında restorasyon iç yüzeyine silan uygulanmasının en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kompozit rezin restorasyon içerisindeki doldurucuların rezin simanla reaksiyona girerek bağlanmanın sağlanması
B) Kompozit rezin restorasyonun polimer yapısının aşındırılarak rezin siman ile bağlanma ara yüzeyinin arttırılması
C) Kompozit rezin restorasyon yüzeyinin pürüzlendirilmesini sağlayarak rezin simanın bu girintilere bağlanmasının sağlanması
D) Rezin simanın içerisindeki polimerizasyon başlatıcıların aktive edilmesi
E) Rezin simanın içeriğinde bulunan doldurucuların yüzey enerjilerinin azaltılması

6. Aşağıdakilerden hangisi adeziv amalgam restorasyonların avantajları arasında yer almaz?

A) Postoperatif hassasiyeti azaltması
B) Kalan diş dokularının kırılma dayanımlarını arttırması
C) Marjinal sızıntıyı azaltması
D) Sekonder çürük oluşma riskini azaltması
E) Amalgamın klinik uygulanmasını kolaylaştırması

7. Kısa dalga boylarındaki ışığı mavi renk olarak yansıtma, uzun dalga boylarındaki ışığı ise sarı/kırmızı renkte geçirme olarak tanımlanan optik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Floresans
B) Translüsensi
C) Opalesans
D) Opasite
E) Transparansi

8. İyi bir izolasyon sağlandığı ve herhangi bir kontaminasyon olmadığı takdirde, kaviteye ilk yerleştirilen kompozit rezin tabakası polimerize edildikten sonra, üzerine yerleştirilen ikinci kompozit rezin tabakası ile aralarında oluşan bağlantı aşağıdakilerden hangisiyle esas olarak sağlanmaktadır?

A) Yüzeyde bulunan silan bağlayıcı ajan ile kimyasal bağlantı sağlanmaktadır.
B) Yüzeyde bulunan adeziv bağlayıcı ajan ile kimyasal bağlantı sağlanmaktadır.
C) Yüzeyde bulunan girinti çıkıntılar ile mikromekanik bağlantı sağlanmaktadır.
D) Yüzeyde bulunan kamforokinon ile fotokimyasal bağlantı sağlanmaktadır.
E) Yüzeyde bulunan oksijen inhibisyon tabakası ile kimyasal bağlantı sağlanmaktadır.

DUSDATA®

DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Kazanan her 4 kişiden 3'ü DUSDATA'dan

DUS Haziran 2023'te

İlk 10'da 8 kişi

İlk 50'de 38 kişi

İlk 100'de 79 kişi,

İlk 200'de 151 kişi

İlk 300'de

224

DUS Ekim 2023'te

İlk 10'da 9 kişi

İlk 50'de 42 kişi

İlk 100'de 72 kişi,

İlk 200'de 142 kişi

İlk 300'de

226

Kişi Dusdata ile kazandı...

9. **Diş renklenmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

A) Klorheksidin kullanımına bağlı renklenmeler yeşil renkte gözlenir.
B) Florozis renklenmeleri opak, beyaz sarımsı veya kahverengi olarak izlenir.
C) Dentinogenezis imperfektada beyaz opak renklenmeler görülür.
D) Nasmyth zarı artıkları kırmızı olarak izlenir.
E) Amelogenezis imperfektada gri renklenmeler görülür.

10. Kırk beş yaşındaki kadın hasta, sol alt premolar-molar bölgesindeki kompozit restorasyonların estetik görüntüsünden rahatsız olduğu için yenilenmesi talebiyle kliniğe başvuruyor. Hastanın anamnezinden aynı bölgede önceden dentin aşırı duyarlılığı şikâyeti olduğu ve tedavi amacıyla o bölgeye florür uygulandığı öğreniliyor.

Aşağıdakilerden hangisinin uygulanmış olması bu hastada oluşan renklenmenin <u>en olası</u> nedenidir?

A) Sodyum florür
B) Sodyum silika florür
C) Stanöz florür
D) Sodyum monoflorofosfat
E) Potasyum klorür

11.

I. Mandibular lateral dişler mandibular santral dişlerden daha geniştir.
II. Mandibular santral dişlerin singulumu meziodistal olarak ortada yer alırken lateral dişlerin singulumu distale doğru konumlanır.
III. Mandibular santral dişlerin proksimal temas alanı orta üçlüde yer alır.

Daimî mandibular santral ve lateral kesici dişler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I ve III



12.

I. Yüzeyindeki ince yapışkan oksit tabakası, biyolojik uyumu ve korozyon direncini sağlar.
II. Düşük özgül ağırlığı, ağırlıkça daha hafif restorasyonların üretilmesine imkan verir.
III. Yüksek erime sıcaklığı ve okside olarak diğer materyallerle kimyasal reaksiyona girme eğilimi nedeniyle geleneksel döküm yöntemleriyle elde edilmeleri zordur.
IV. Döküm sırasında rövetman ile reaksiyonu sonucu üzerine gelecek porselenle bağlantıyı arttıran ve yüzeyde arzu edilen alfa-case olarak isimlendirilen bir tabaka oluşur.

Titanyum ve titanyum alaşımları (Ti-6Al-4V) ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I, II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

13.

I. Siman retansiyonlu restorasyonlara göre estetik üstünlüğü fazladır.
II. Maliyeti daha uygundur.
III. Kısa kron boyu olan vakalarda daha iyi retansiyon sağlar.
IV. Porselen kırılma riski siman destekli restorasyonlara göre daha düşüktür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri implant destekli vida retansiyonlu restorasyonların avantajlarındandır?


A) I, II ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) Yalnız III
E) II ve III

14. Atipik mandibular hareketleri olan bir hastanın maksiller ve mandibular tüm posterior kuadrantlarındaki dişlerinin eş zamanlı olarak sabit bölümlü protezlerle restore edilmesi planlanıyor.

Böyle bir hastanın tedavisi sırasında aşağıdaki artikülatörlerden hangisinin kullanımı <u>en uygundur</u>?

A) Ayarlanamayan basit artikülatör
B) Okluzör
C) Arkon tipi yarı ayarlanabilir artikülatör
D) Non-arkon tipi yarı ayarlanabilir artikülatör
E) Tam ayarlanabilir artikülatör

15.



Şekildeki, 20 yaş dişlerinin de protez planlamasına dâhil edileceği hareketli bölümlü protez endikasyonu konulan kısmî dişsiz hastanın Kennedy-Applegate'e göre dental ark sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıf IV, modifikasyon 2
B) Sınıf II, modifikasyon 2
C) Sınıf III, modifikasyon 2
D) Sınıf III, modifikasyon 3
E) Sınıf II, modifikasyon 3

DUS DATA®

DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sadece fakülte derecelerine mi derece yaptırıyoruz?

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz	İlk 100'de ama fakülte DERECE'si olmayan kursiyer sayımız	İlk 100'de ama üç Büyük İl'de olmayan kursiyer sayımız
DUS Sonbahar 2023 sınavında	65 kursiyerimiz	35 kursiyerimiz
	*Bu sınavda ilk 100'de 72 kursiyerimiz vardı.	
DUS İlkbahar 2023 sınavında	74 kursiyerimiz	34 kursiyerimiz
	*Bu sınavda ilk 100'de 79 kursiyerimiz vardı.	
DUS 2022 sınavında	76 kursiyerimiz	47 kursiyerimiz
	*Bu sınavda ilk 100'de 85 kursiyerimiz vardı.	
DUS 2021 sınavında	55 kursiyerimiz	28 kursiyerimiz
	*Bu sınavda ilk 100'de 63 kursiyerimiz vardı.	



İsim isim detayları görmek için www.dusdata.com'u ziyaret ediniz.

16. Mandibular tam protezlerde oklüzal düzlemin posterior yüksekliği yaklaşık olarak retromolar ped yüksekliğinin ne kadarında yer almalıdır?

A) 1/1
B) 1/5
C) 2/5
D) 2/3
E) 1/4

17. Normal iskeletsel yapıya ve alveoler kemiğin desteğine sahip bir hasta için yapılacak olan maksiller tam protezde, diş dizimi kurallarına göre santral kesici dişlerin labial yüzeyleri ile insiziv papil arası mesafe genellikle ne kadar olmalıdır?

A) 0-2 mm
B) 2-4 mm
C) 4-6 mm
D) 8-10 mm
E) 12-14 mm

18.

I. Restorasyon üzerinde hazırlanacak yere uygun olarak kron preparasyonunda da tırnak yuvası hazırlanmalıdır.
II. Kron restorasyonu üzerinde paralelometre yardımıyla uygun ekvator hattı oluşturulmalıdır.
III. Kron restorasyonu üzerinde yer alacak proksimal ve resiprokal rehber düzlemler protezin giriş yoluna dik olarak oluşturulmalıdır.

Geleneksel hareketli bölümlü protezlerde kronlanması gereken destek dişin preparasyonu ve restorasyonu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III



19. Maksiller birinci molar dişin yerine uygulanacak implant destekli tek kronlarda, oklüzyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Oklüzal kuvvetler dişin uzun aksı boyunca iletilmelidir.
B) İmplant üzerindeki lateral kuvvetler azaltılmalıdır.
C) Lateral kuvvetler mümkün olduğunca implantın anteriorundaki doğal dişler üzerine doğru yönlendirilmelidir.
D) Keskin kasp eğimleri ve geniş oklüzal tablalar oluşturularak implant bileşenlerine gelen kuvvetler azaltılmalıdır.
E) Yıkıcı kuvvet oluşturmamak için lateral hareketlerde karşılıklı koruyuculu oklüzyon kullanılmalıdır.

20.

I. Ağzın açılması sırasında deviasyon varlığı
II. Ağzın kapalı pozisyonunda diskin kondile göre daha anterior pozisyonda olması
III. Ağzın açılması sırasında karşı tarafa doğru defleksiyon varlığı

Yukarıdakilerden hangileri temporomandibular eklemin redüksiyonlu disk deplasmanına ait özelliklerindendir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III

21. Çene ve yüz bölgesinde ağrı şikâyetiyle başvuran hastanın klinik muayenesinde masseter ve temporal kasların palpasyonunda ağrı saptanıyor. Hastada temporomandibular eklem foksiyonunun normal olduğu ve palpasyonunda ağrı bulunmadığı tespit ediliyor. Hastada dişlerin oklüzal yüzeylerinde aşınma olduğu saptanıyor.

Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Artrosentez
B) Non-steroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı
C) Yüze sıcak uygulanması
D) Yumuşak diyet
E) Oklüzal plak yapılması

22. Aşağıdakilerden hangisi temporomandibular eklemde kapsüler ligamentin sekonder foksiyonlarındandır?

A) Medial kuvvetlere direnç göstermek
B) Lateral kuvvetlere direnç göstermek
C) Eklemin aşırı hareketlerini önlemek
D) İnferior kuvvetlere direnç göstermek
E) Alt ve üst eklem boşluğundaki sinoviyal sıvıyı muhafaza etmek

23. Nazolabial flep aşağıdaki arterlerden hangisiyle beslenir?

A) Torakoakromiyal arter
B) Anterior ve posterior derin temporal arter
C) Anguler arter
D) Oksipital dallar ve superior tiroid arter
E) Fasiyal arter


DUS DATA

DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sonbahar 2023

İL BİRİNCİLERİMİZ

16 DUS 14 BİRİNCİ



İlkbahar 2023

İL BİRİNCİLERİMİZ

15 DUS 13 BİRİNCİ



DUS 2022 (Ekim)

İL BİRİNCİLERİMİZ

14 DUS 12 BİRİNCİ



24. Çok sayıda diş çekimi yapılacağı zaman diş çekimine en önce nereden başlanmalıdır?

A) Üst çene posterior dişler
B) Üst çene anterior dişler
C) Alt çene posterior dişler
D) Alt çene anterior dişler
E) Kanin dişler

25. Akut dentoalveoler apse gelişmiş, hamileliğinin üçüncü trimesterinde olan bir hasta için aşağıdaki antibiyotik - analjezik ikililerinden hangisi en uygundur?

A) Tetrasiklin - İbuprofen
B) Gentamisin - Oksikodon
C) Amoksisilin - Parasetamol
D) Kloramfenikol - Naproksen
E) Eritromisin - Hidrokodon

26. Aşağıdakilerden hangisi odontojenik epitel kökenli kistlerden değildir?

A) Radiküler kistler
B) Gingival kistler
C) Lateral periodontal kistler
D) Dentigeröz kistler
E) Anevrizmal kemik kistleri

27. Çenelerde görülen aşağıdaki patolojik oluşumlardan hangisinin kleidokraniyal disostozis ile birlikte görülmesi en olasıdır?

A) Unikistik ameloblastoma
B) Kalsifiye odontojenik kist
C) Dentigeröz kist
D) Adenoameloblastoma
E) Ameloblastik fibroma

28. Aşağıdakilerden hangisi Mikulicz sendromunun klinik belirtileriden biridir?

A) Parotis tükürük bezinde büyüme
B) Vezikül ve bül oluşumu
C) Multiloküler kistler
D) Gömülü dişler
E) Eksik diş oluşumu



29. Aşağıdaki durumların hangisinde tedavi amacıyla sistemik antibiyotik kullanım endikasyonu yoktur?

A) Lenfadenopati
B) Osteomiyelit
C) Selülit
D) Alveoler osteitis
E) Şiddetli perikoronitis

30. Anti-HIV testi pozitif hastanın tedavisi yapılırken hastada kullanılan enjektörün ucu diş hekiminin eline batıyor.

Bu diş hekimi için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en uygundur?

A) 72 saat içinde anti-retroviral proflaksi başlanır.
B) 7-10 gün sonra anti-retroviral proflaksi başlanır.
C) HIV serolojik göstergeleri 10 gün boyunca takip edilir.
D) Yaralanma değerlendirilir, 6 ay sonra kontrole çağırılır.
E) Proflaksiye gerek yoktur, takipler sonrasında HIV pozitifliği saptanırsa tedavi başlanır.

31. Diş çürüğü şikâyeti ile kliniğe başvuran 12 yaşındaki erkek hastanın, intraoral muayenesinde bilateral bukkal mukozasında fissürlü kalın plak tarzında beyaz lezyonlar tespit ediliyor. Hasta bu lezyonların çok uzun süredir var olduğunu ve rahatsızlık duymadığını ifade ediyor. Sağ vestibüler mukozada da aynı tipte lezyon görülüyor. Mukoza gerildiğinde lezyonlarda kaybolma gözlenmiyor. Sistemik olarak herhangi bir bulgusu olmayan hasta, vücudunun diğer bölgelerinde de böyle bir durum olmadığını ifade ediyor. Öyküsünden hastanın babasında da benzer lezyonların bulunduğu öğreniliyor. Genetik incelemede hem babada hem de çocukta keratin 4 geninde mutasyon bulunduğu tespit ediliyor. Histopatolojik olarak epitel tabakasında kalınlaşma, belirgin akantozis, intraselüler ödem ve parakeratoz saptanıyor.

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyaz süngerimsi nevus
B) Herediter benign epitelyal diskeratoz
C) Liken planus
D) Lupus eritematozus
E) Lökodem

32. Aşağıdaki oral mukozal bölgelerden hangisinde görülen lökoplaki lezyonun malign transformasyon riski diğerlerine göre daha yüksektir?

A) Sert damak mukozası
B) Bukkal mukoza
C) Ağız tabanı mukozası
D) Vestibül mukoza
E) Retromolar mukoza

33. Kırk beş yaşındaki kadın hasta ağız kokusu şikâyeti ile kliniğe başvuruyor. Panoramik radyografisinde mandibula ramus bölgesinde küçük, çok sayıda, iyi sınırlı kalsifikasyonlar tespit ediliyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miyositis ossifikans
B) Tonsillolit
C) Antrolit
D) Flebolit
E) Sistiserkozis

34.

I. Koronoid hiperplazi
II. Ankiloz
III. Sublüksasyon
IV. Redüksiyonsuz disk deplasmanı

Yukarıdakilerden hangileri ağız açmada kısıtlılığa sebep olabilir?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II ve IV

35. **Çene kemiklerinde görülen aşağıdaki lezyonlardan hangisinde internal radyoopak kalsifikasyon gözlenmez?**

A) Sementoblastoma
B) Periapikal semental displazi
C) Ossifiye fibrom
D) Eozinofilik granüloma
E) Adenomatoid odontojenik tümör

36. **Düşük enerjili X-ışını fotonlarının yüksek atom numaralı materyaller tarafından absorbe edilmesi sonucunda, ışın demetinin ortalama enerjisinin artması ile oluşan ve koyu bantlar şeklinde gözlenen artifakt aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Hareket artifaktı
B) Halka artifaktı
C) Parsiyel hacim artifaktı
D) Saçılma artifaktı
E) Işın sertleşmesi artifaktı

37.

I. Fokal spot-obje mesafesi kısa olmalıdır.
II. Obje ve reseptör birbirine paralel olmalıdır.
III. Fokal spot küçük olmalıdır.

Projeksiyon geometrisinin temel prensipleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız II

DUSDATA
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SONBAHAR 2023 DUS
DERECELER DUSDATA'dan
İlk 10'da 9 kişi İlk 100'de 72 kişi bizimle kazandı.


1.
Dt. Emine Hazan AKÇADOĞAN
Puanı: 75.042
Medipol Üni. Diş Hekimliği Fakültesi
ZONGULDAK ŞUBE KURSİYERİ
Derece Değil

16 DUS
14
BİRİNCİ


3.
Dt. Yusuf Bekir KARA
Puanı: 73.201
İstanbul Üni. Diş Hekimliği Fakültesi


4.
Dt. Oğuzhan ERDEM
Puanı: 72.955
Hacettepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi


6.
Dt. Doğa VİJDAN
Puanı: 72.587
Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi


7.
Dt. Arda TOPTAŞ
Puanı: 72.218
Hacettepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi


8.
Dt. Selin ÖZMAÇİN
Puanı: 72.096
Okan Üni. Diş Hekimliği Fakül.


9.
Dt. Ersagun KARA
Puanı: 71.973
Kırıkkale Üni.Diş Hekimliği Fakül.


10.
Dt. Büşra UYSAL
Puanı: 71.850
Süleyman Demirel Üni. Diş Hekimliği Fakül.


10.
Dt. Seda SARI
Puanı: 71.850
Hacettepe Üni. Diş Hekimliği Fakül.

38. Aşağıdakilerden hangisi mandibular anterior bölgeden alınan periapikal radyografide görülen anatomik oluşumlardan biri değildir?

A) Mental foramen
B) Mental ridge
C) Genial tüberkül
D) Lingual foramen
E) Mental fossa

39. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin radyografik görüntüsünde tipik olarak sabun köpüğü benzeri bulgu görülmesi en az olasıdır?

A) Ameloblastoma
B) Dev hücreli tümör
C) Anevrizmal kemik kisti
D) Santral hemanjiyom
E) Burkitt lenfoma

40. Röntgen tüpünde döner anot kullanılması ile aşağıdakilerden hangisinin miktarında azalma hedeflenmiş olur?

A) Katot-anot arası elektron hızı
B) Anot ısısı
C) Termoiyonik emisyon
D) Anotta oluşan X-ışını miktarı
E) Penumbra

41.

I. Periodontal ligament kaynaklı Sharpey liflerinin penetre olduğu alveol kemik yapıdır.
II. Büyük oranda lameller kemik yapısına sahiptir.
III. Alveol kemiğinin sadece bukkal/labial yüzeyinde bulunur.
IV. Spongioz kemik yapısında olmadığı için diş çekimi sonrası geç rezorbe olur.

Alveol kemiğin yapısında yer alan demetsi kemik (bundle bone) ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) I ve III
C) I ve IV
D) I ve II
E) I, II ve IV



42. Diş eti bağ dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Lamina propriada yer alan retiküler tabaka, alveoler kemiğin periosteumu ile ilişkilidir.
B) Ara maddesi (ground substance) liflerin ve hücrelerin arasını dolduran, amorf, çok miktarda su içeren bir yapıdır.
C) İçeriğindeki oksitalan lifler, kollajen liflerden biridir.
D) Fibröz bir yapıya sahiptir.
E) Esas hücresi fibroblasttır.

43. Periodontal hastalıkta bağ dokusu yıkımında önemli rol oynayan matriks metalloproteinaz (MMP)'lar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Fibroblastlar, MMP üreten hücrelerdendir.
B) Makrofajlar, doku kaynaklı MMP inhibitörlerini üreten hücrelerdendir.
C) Periodontitiste diş eti oluğu sıvısında MMP seviyesi artar.
D) Serum kaynaklı MMP inhibitörleri, bağ dokusu yıkımının engellenmesinde rol oynamaz.
E) MMP-8 nötrofil kaynaklı bir kollajenazdır.

44. Aşağıdaki hastalık ve sendromlardan hangisinde oral melanin pigmentasyonunda artış görülmesi beklenmez?

A) Nörofibromatozis
B) Peutz-Jeghers sendromu
C) Down sendromu
D) Albright sendromu
E) Addison hastalığı

45. Diş eti oluğu sıvısı (DOS) akış miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Periodontal cerrahi sonrasında ilk günlerde akış miktarı azalır.
B) Sirkadyen ritim DOS hacmini etkiler.
C) Periodontal enflamasyonda akış miktarı artar.
D) Hamilelik, ovulasyon, oral kontraseptif kullanımı akış miktarını artırır.
E) Mekanik stimülasyon (çiğneme, diş fırçalama) akışı artırır.

46.

I. Sondlamada kanama ve/veya süpürasyon
II. Keratinize mukoza genişliği < 2 mm
III. Sondlamada cep derinliği ≥ 6 mm
IV. Kemik kaybı ≥ 3 mm
V. Plak indeksi > 1,5

Daha önceki klinik ve radyografik muayene verilerinin mevcut olmadığı durumda peri-implantitis tanısı konulabilmesi için implantın çevre dokularında yukarıdaki bulgulardan hangilerinin varlığı gereklidir?

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V

DUSDATA®
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

SONBAHAR 2023 DUS'ta BÜYÜK DAMGA

BAŞARI 1



TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Dt.Emine Hazan AKÇADOĞAN

BAŞARI 2

Sonbahar 2023 DUS'ta
9 kişi **İlk 10'da**
Tusdata ile kazandı
6 tanesi fakülte derecesi değil

BAŞARI 3

Sonbahar 2023 DUS'ta
42 kişi **İlk 50'de**
Tusdata ile kazandı
37 tanesi fakülte derecesi değil

BAŞARI 4

DUS kursu yaptığımız
30 ilden
23
il birincisi

DUSDATA'dan

BAŞARI 5

İL BİRİNCİLERİMİZ



BAŞARI 6

DUS Sonbahar 2023 ilk 100'deki
65
kursiyerimiz

FAKÜLTE DERECESİ DEĞİL

BAŞARI 7

DUS Sonbahar 2023 ilk 100'deki
35
kursiyerimiz

ÜÇ BÜYÜK İLDE DEĞİL

BAŞARI 8

DERS NOTLARIMIZ 2023 DUS'ta

DERS NOTLARIMIZ
Toplamda
113
Referans /120 Soru

REFERANS VERDİ

BAŞARI 9

16 DUS
14 BİRİNCİ

47.

I. Yapısındaki amelogenin sayesinde gingival fibroblast, periodontal ligament fibroblastı ve osteoblastların proliferasyonunu artırır.
II. Kemik içi defektlerde ve furkasyon problemlerinin tedavisinde kullanılabilir.
III. Osteojenik özelliğe sahiptir.
IV. Akışkan olması sebebi ile kemik greft materyalleri ile kombine edilmeden kullanılamaz.

Rejeneratif periodontal tedavide kullanılan mine matriks türevleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve IV

48. Hammerle ve ark. tarafından diş çekimi sonrasında dental implantların yerleştirme zamanlamasına göre 4 farklı uygulama tanımlanmıştır:

- Tip 1 Immediate (diş çekimi ile aynı seansta)
- Tip 2 Erken (yumuşak doku iyileşmesi sonrasında)
- Tip 3 Erken (kısmi kemik iyileşmesi sonrasında)
- Tip 4 Geç (kemik iyileşmesi sonrasında)

Yukarıda belirtilen uygulamalara ait aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Tip 2 yerleştirmede primer stabilitenin sağlanması güç olabilir.
B) Tip 1 yerleştirmede implantın bukkal kemik ile temas etmesi, bukkal kemiğin korunmasına katkı sağlar.
C) Tip 3 yerleştirme genel olarak çekim sonrası 12-16 haftalık bekleme zamanına karşılık gelir.
D) Tip 2 yerleştirme genel olarak çekim sonrası 4-8 haftalık bekleme zamanına karşılık gelir.
E) Tip 4 yerleştirmede yumuşak doku maturasyonu flep yönetimi açısından avantaj sağlar.

49. Periodontal ve peri-implant hastalıkların tedavisinde air flow (air polishing) cihazların kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Subgingival alanda düşük abraziv etkili tozların kullanımı uygundur.
B) Glisin, düşük abraziv etkili olduğundan dental biyofilmin uzaklaştırılmasında etkili değildir.
C) Eritritol toz, implant yüzeyinin temizliği için uygun abrazivlerden biridir.
D) Bikarbonat toz kullanımı kök yüzeyinde ve restorasyonlarda madde kaybına neden olabilir.
E) Air flow kullanımı, diş eti üzerinde düşük düzeyde ve geçici hasara neden olabilir.



50.

I. Çinko iyonları uçucu sülfür içeren bileşikleri baskılayarak ağız kokusunu azaltır.
II. Triklosan araşidonik asit metabolitlerini baskılayarak antiinflamatuvar etki gösterir.
III. Klorheksidinin dişte boyanma, tat alma bozukluğu gibi yan etkileri vardır.

Antiseptik ajanlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

51. Aşağıdaki servikal vertebral maturasyon dönemlerinden hangi ikisi diğerlerine göre mandibular büyüme atılım döneminden kronolojik olarak en uzakta yer almaktadır?

(CS: Cervical Stage)

A) CS2-CS3
B) CS1-CS6
C) CS3-CS4
D) CS2-CS4
E) CS2-CS5

52.

I. Azalmış total ön yüz yüksekliği
II. Artmış arka yüz yüksekliği
III. Artmış overbite

Horizontal referans düzlemleri birbirine hemen hemen paralel seyretmekte olan bir hastada, yukarıdakilerden hangilerinin görülmesi en olasıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

53. Yüz asimetrisi şikâyeti ile ortodonti kliniğine başvuran 25 yaşındaki erkek hastaya ortodontik tedavi yapılması planlanmaktadır.

I. Panoramik radyografi
II. Lateral sefalometrik radyografi
III. El-bilek radyografisi
IV. Posterio-antreior radyografi

Ortodontik tanı ve tedavi planlaması için bu hastadan alınması gerekebilecek radyolojik kayıtlar yukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız IV
B) II ve IV
C) I ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

DUSDATA®
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sonbahar 2023 DUS'ta

İSTİKRARLI BAŞARI

İlk 10'da 9 kişi

DUSDATA ile kazandı.




İlk 20'de 16 kişi

DUSDATA ile kazandı.




İlk 50'de 42 kişi

DUSDATA ile kazandı.



İlk 100'de 72 kişi

DUSDATA ile kazandı.




54. Ortodontik sefalometrik analizde fonksiyonel oklüzal düzlemi kullanarak maksilla ve mandibulanın anteroposterior yön ilişkilerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçümlerden hangisi kullanılır?

A) FMA açısı ölçümü
B) Wits ölçümü
C) ANB açısı ölçümü
D) Y aksı açısı ölçümü
E) Kraniyal kaide ölçümü

55. Periodontal problemler sebebiyle kökünü çevreleyen alveoler kemiğin seviyesinde azalma meydana gelmiş bir dişin ortodontik hareketi planlanırken aşağıdaki değişimlerden hangisinin varlığı öngörülmez?

A) Dişin ankraj değerinin normalden daha düşük olması
B) Dişin direnç merkezinin normalden daha apikalde yer alması
C) Paralel diş hareketi istenilen durumlarda kuvvet uygulama noktasının normale göre daha insizalde olması gerekliliği
D) Kontrollü devrilme hareketi istenilen durumlarda kuvvet uygulama noktasının normale göre daha apikalde olması gerekliliği
E) Uzama hareketi istenilen durumlarda kuvvet miktarının normale göre azaltılması gerekliliği

56.



Büyüme gelişim çağında iskeletsel Sınıf II anomaliye sahip bir birey hareketli fonksiyonel bir aparey ile tedavi edilecektir.

Bu amaçla yapılması planlanan resimdeki hareketli apareyin adı nedir?

A) Frankel
B) Bionator
C) Aktivatör
D) Twin Block
E) Pendulum

57. Dudak damak yarığı olgularında ortodontik müdahale açısından sekonder alveoler kemik greftlemesi için en ideal olan zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daimî 1. premorlar sürmeden önce
B) Daimî 2. premorlar sürmeden önce
C) Daimî kaninler sürmeden önce
D) Daimî 2. molarlar sürmeden önce
E) Daimî santral dişler sürmeden önce

58. Ortodontik tedavilerde karşılaşılabilen yan etkilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En sık üst 1. molar dişlerde kök rezorpsiyonuna rastlanır.
B) Anormal kök yapısına sahip dişler normal olanlardan daha fazla kök rezorpsiyonu riski taşıyabilirler.
C) Ortodontik tedaviye başlamadan önce yetersiz oral hijyen varlığı, beyaz nokta lezyonlarının oluşumu için en önemli risk faktörlerinden biridir.
D) Ağır kuvvetler hafif kuvvetlere göre daha fazla kök rezorpsiyonuna sebep olabilirler.
E) RME prosedürü premolar ve molar dişlerde kök rezorpsiyonuna sebep olabilirler.

59.

I. Hasta kooperasyonu
II. Uygulanan kuvvetin şiddeti ve süresi
III. Kuvvetin uygulanma yönü

Maksiller molar dişlerin ağız dışı aparey ile distalizasyonu istenen ortodontik tedavinin başarısında yukarıkilerden hangileri etkilidir?

A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız I
E) I, II ve III

60. Hareketli ortodontik apareyler ve kullanımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ağızda taşınmaları hastanın kooperasyonuna bağlıdır.
B) Anormal alışkanlıkların önlenmesine yardımcı olabilirler.
C) Diş fırçalamak için çıkarılabilirler.
D) Paralel diş hareketi elde etmek için kullanılırlar.
E) Sabit ortodontik apareylere göre iatrojenik hasara neden olma olasılıkları daha azdır.



İlk 10'da **9** kişi

DUSDATA®
DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

16 DUS 14 BİRİNCİ

SONBAHAR 2023 DUS

İllere ve fakültelere bakın!

Adı Soyadı	Fakültesi	Sıralama	Fakülte Derecesi
Emine Hazan AKÇADOĞAN	Medipol DİŞ (Zonguldak DUSDATA)	1	DEĞİL
Yusuf Bekir KARA	İstanbul DİŞ (İstanbul DUSDATA)	3	DEĞİL
Oğuzhan ERDEM	Hacettepe DİŞ (Ankara DUSDATA)	4	DEĞİL
Doğa VİJDAN	Okan DİŞ (İstanbul DUSDATA)	6	+
Arda TOPTAŞ	Hacettepe DİŞ (Ankara DUSDATA)	7	DEĞİL
Selin ÖZMAÇİN	Okan DİŞ (İstanbul DUSDATA)	8	DEĞİL
Ersagun KARA	Kırıkkale DİŞ (Kırıkkale DUSDATA)	9	DEĞİL
Büşra UYSAL	Süleyman Demirel DİŞ (Isparta DUSDATA)	10	+
Seda SARI	Hacettepe DİŞ (Ankara DUSDATA)	10	+

Bu tablo; okul derecesi farketmeksizin herkese ama herkese **UMUT** vermiyor mu?

61. Travmatik yaralanmayı takiben dişlerin uzun dönemde oklüzal seviyenin altında kalması (infraoklüzyon) durumunda aşağıdaki hasta gruplarının hangisi için dekoronasyon uygun bir tedavi yaklaşımıdır?

A) Sarsıntı (konküzyon) tablosu görülen erişkin hastalar
B) Avülsiyon sonrası ankiloz tablosu görülen büyüme-gelişim çağındaki hastalar
C) Sublüksasyon tablosu görülen büyüme-gelişim çağındaki hastalar
D) Avülsiyon sonrası ankiloz tablosu görülen erişkin hastalar
E) Sarsıntı (konküzyon) tablosu görülen büyüme-gelişim çağındaki hastalar

62.

I. Apeks bulucuların çoğu doğru (direkt) akım kullanarak çalışırlar.
II. Hamilelerde ve engelli hastalarda kullanılabilirler.
III. Tedavilerin hepsi radyografi alınmadan güvenle tamamlanabilir.

Apeks bulucular ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) Yalnız III

63. Kök ucundaki lezyonun apikal cerrahi ile uzaklaştırılmasına karar verilen dişlerden hangisinde çalışma sahası anatomik yapılardan daha az etkilenir?

A) Alt 2. molar diş
B) Üst 1. molar diş
C) Alt kanin dişi
D) Alt 2. premolar diş
E) Üst santral kesici diş

64. Aşağıdaki enstrümanlardan hangisi kök kanalında kırılan bir aletin uzaklaştırılmasında kullanılamaz?

A) Operasyon mikroskobu
B) Ultrasonik uçlar
C) Hedstrom tipi kanal eğeleri
D) Pulse oksimetre cihazı
E) Gates-glidden frez seti

65. Kök kanal dolum yöntemlerinden geleneksel termomekanik kompaksiyon tekniğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Apikal taşkınlık riski vardır.
B) Kanal içi düzensizliklere adapte olma yeteneği iyi değildir.
C) Eğimli kanallarda kullanımı kolaydır.
D) Isı kontrolü sağlamak kolaydır.
E) Alet kırığı riski yoktur.

66. Aşağıdakilerden hangisinin elektrikli pulpa testine pulpa cevabının yorumlamasında yanlış pozitif cevap oluşturması en olasıdır?

A) Parsiyel pulpa nekrozu
B) Hastanın aldığı sedatif ilaçlar
C) Yeni sürmüş immatür diş
D) Kalsifikasyon
E) Son zamanlarda travmaya uğramış diş

67. Radiks entomolaris ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çok köklü dişlerde pulpa odasının apiko-oklüzal yönde genişlemesiyle karakterizedir.
B) Oklüzal yüzde bukkal ve lingual kasp tepesi arasında bulunan ekstra bir kasptır.
C) Alt 1. molar dişlerin distro-lingualinde görülebilen ilave kök formasyonuyla karakterizedir.
D) Köklerin füzyonu sonucu oluşan kanal formasyonudur.
E) Gelişim esnasında dental papillanın invajinasyonu sonucu oluşan şekil bozukluğudur.

68.

I. % 5'lik sodyum hipoklorit
II. % 17'lik etilendiamintetraasetik asit
III. % 2'lik klorheksidin diglukonat

Yukarıdaki kök kanal irrigasyon solüsyonlarından hangilerinin, kök gelişimini tamamlamamış bir dişin endodontik revaskülarizasyon tedavisinde kullanımı önerilmektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

69. Aşağıdakilerden hangisi dişlerde vertikal kök kırığının tanısı için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Isırma testi
B) Soğuk testi
C) Diş etinde fistül ağzı varlığının araştırılması
D) Radyografik inceleme
E) Periodontal cep derinliğinin ölçülmesi

70. Aşağıdakilerden hangisi eski kanal dolgusunu uzaklaştırmak için kullanılmaz?

A) Döner şekillendirme sistemleri
B) El tipi kök kanal eğeleri
C) Isıtılmış enstrümanlar
D) Kimyasal çözücüler
E) Metilen mavisi

DUS DATA® DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TUSDATA®
TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

Sadece TUS'ta mı başarılıyız?

TUS
DUS
YDUS

SONBAHAR 2023 TUS

TUS Birincisi BİZDEN

İlk 10'da 9 kişi
İlk 100'de 96 kişi



SONBAHAR 2023 DUS

DUS Birincisi BİZDEN

İlk 10'da 9 kişi,
İlk 100'de 72 kişi



Haziran 2023 PEDİATRİ YDUS

İlk 10'da 8 kişi,
İlk 100'de 72 kişi



Haziran 2023 DAHİLİYE YDUS

YDUS Dahiliye Birincisi BİZDEN

İlk 10'da 9 kişi,
İlk 100'de 78 kişi



Bizimle Kazandı...

71. Daimi dişlerin kök gelişimlerini tamamlama zamanlarıyla ilgili aşağıdaki sürelerden hangisi yanlıştır?

A) Üst santral kesiciler: 10 yaş
B) Üst kaninler: 13-15 yaş
C) Üst ve alt 1. Molarlar: 9-10 yaş
D) Alt 1. Premolarlar: 12-13 yaş
E) Alt 2. Molarlar: 11-13 yaş

72. Sağlıklı ve gelişimini tamamlamış bir insan dişine soğuk uygulaması yapıldığında, dişte ilk birkaç saniye kısa ve keskin bir ağrı hissedilir. Soğuk uygulaması devam ettiğinde, önceki kadar keskin olmayan daha derin ve donukl bir ağrı oluştuğu gözlemlenir.

Yukarıdaki durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Termal stimülasyonlar miyelinsiz C fibrillerini etkilemezken, miyelinli A fibrillerini direkt ve ilk olarak etkiler. Etki devam ettikçe ağrının şekli değişir.
B) Termal stimülasyonlar miyelinli A fibrillerini etkilemezken, miyelinsiz C fibrillerini direkt ve ilk olarak etkiler. Etki devam ettikçe ağrının şekli değişir.
C) A ve C fibrilleri soğuk stimülasyona ilk cevabı birlikte ve aynı anda verdikleri için öncelikle ani ve keskin bir ağrı hissedilir, sonrasında aktivasyonları azaldığından ağrı durgunlaşır.
D) Soğuk stimülasyona ilk cevap miyelinli A fibrilleri ile verilir, sonrasında miyelinsiz C fibrillerinin gecikmiş aktivasyonu devreye girer.
E) Soğuk stimülasyona ilk cevap miyelinli C fibrilleri ile verilir, sonrasında miyelinsiz A fibrillerinin gecikmiş aktivasyonu devreye girer.

73. Süt dentisyondaki dişler, daimî dentisyondakilerle karşılaştırıldığında karakteristik özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Süt molar dişlerin servikal kurvatürlerinin yukarısındaki bukkal ve lingual yüzeyler, daimî molar dişlerindekinden daha düzdür.
B) Daimî dişlere kıyasla, maksiller süt molar dişlerin bukkal kökleri meziodistal yönde, palatal kökleri ise bukkolingual yönde daha dardır.
C) Anterior süt dişi kronlarında, daimî dişlerden farklı olarak meziodistal boyut, serviko-insizal boyuta oranla daha geniştir.
D) Süt dişlerinde krondaki pulpa genişliği hacimsel olarak daimî dişlere göre daha fazladır.
E) Kronun servikal kısmındaki mine prizmaları süt dişlerinde daimî dişlerden farklı olarak gingival yönde uzanır.

74.

I. Doğumdan sonraki ilk ayda süren dişlerdir.
II. Genellikle alt anterior bölgede gözlenir.
III. Çoğunlukla süpernümerer dişlerdir.
IV. Bebeğin beslenmesini olumsuz etkileyebilir.
V. Mobilitesi yüksek olanların çekilmesi gerekmektedir.

Natal dişler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) II, IV ve V
D) II, III ve V
E) I, III ve V



75.

I. İlk muayenede kontaktlar sıkı ve arayüzeyler göz ile görülemiyorsa posterior bitewing alınmalıdır.
II. İlk muayenede dişlerin periapikal etkilenme bulgusu varsa posterior bölgede periapikal radyografi alınmalıdır.
III. İkinci muayenede çocuk yüksek çürük risk grubundaysa 24-36 ay aralıklarla posterior bitewing alınmalıdır.
IV. Anterior bölgede travma veya şüpheli bir patolojik durum varsa anterior oklüzal radyografi alınmalıdır.

3-6 yaş grubu çocuklarda alınacak radyografi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

76. Ağız içindeki lezyonlara bağlı boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü nedeniyle getirilen 8 yaşındaki kız çocuğun, ağız içi muayenesinde yumuşak damakta palatal ve faringeal bölgede 4-5 adet veziküle rastlanıyor fakat ağız dışı muayenesinde herhangi bir lezyona rastlanmıyor. Çocuğun ebeveynlerinden, lezyonların başlangıçta gri toplu iğne başı büyüklüğünde veziküller iken iki gün içinde rüptüre olarak geniş fibrin kaplı ülserlere dönüştüğü öğreniliyor. Çocuğa semptomatik tedavi öneriliyor. Lezyonların ilerlemeyip iz bırakmadan kendiliğinden geçtiği gözleniyor.

Coxsackie A grup viruslerin neden olduğu bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Primer herpetik gingivostomatit
B) El-ayak-ağız hastalığı
C) Kızamıkçık
D) Herpanjina
E) Hemanjiyoma

77. **Lokal anestezik ajanlar hangi iyon kanalını bloke ederek etki gösterir?**

A) Sodyum
B) Hidrojen
C) Potasyum
D) Kalsiyum
E) Klor

78. Açık apeksli daimî bir kesici dişte kökün orta üçlüsünde meydana gelen horizontal kök kırığında koronal parçanın yer değiştirdiği tespit ediliyor. Parça repoze ediliyor ve splintleniyor.

Bu diş için aşağıdaki splint sürelerinden hangisi <u>en uygundur</u>?

A) 7-10 gün
B) 14 gün
C) 4 hafta
D) 2 ay
E) 4 ay

79. Diş eksikliği şikâyetiyle getirilen 9 yaşındaki kız çocuğun anamnezinden X kromozomuna bağlı dominant geçiş gösteren genetik bir sendromu olduğu öğreniliyor. Çocuğun ağız dışı muayenesinde deri lezyonları olduğu; ağız içi muayenesinde, konik formlu kesici dişleri olduğu ve genel olarak gecikmiş daimî diş erüpsiyonu olduğu görülüyor. Radyografik muayenesinde, hastanın daimî lateral, daimî premolar ve 3. molar diş germlerinin eksik olduğu tespit ediliyor.

Bu çocuk için <u>en olası</u> tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Crouzon sendromu
B) Hallermann-Streiff sendromu
C) İncontinentia pigmenti
D) Gardner sendromu
E) Konjenital sifiliz

80. Dişlerinde renklenme şikâyetiyle getirilen karma dişlenme dönemindeki 9 yaşındaki hastanın ağız içi muayenesinde intrinsik renklenme dışında diş çürüğüne dair herhangi bir bulguya rastlanmıyor. Hastanın sürekli ağız solunumu yaptığı, ağız kuruluğu yaşadığı, sistemik olarak solunum güçlüğü çektiği ve uzun öksürük nöbetleri yaşadığı öğreniliyor.

Bu hastada görülmesi <u>en olası</u> sistemik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biliyer atrezi
B) Eritroblastozis fetalis
C) Hiperbilirübinemi
D) Kistik fibrozis
E) Porfiria

DUSDATA DUS HAZIRLIK

Detaylı bilgi için: www.dusdata.com adresini takip ediniz.

TEMEL BİLİMLER CEVAP ANAHTARI	
1. E	21. C
2. B	22. D
3. B	23. C
4. D	24. B
5. C	25. E
6. B	26. B
7. A	27. A
8. C	28. B
9. B	29. B
10. D	30. D
11. C	31. C
12. D	32. D
13. E	33. C
14. B	34. C
15. E	35. A
16. A	36. A
17. B	37. E
18. C	38. E
19. A	39. E
20. B	40. D

KLİNİK BİLİMLER CEVAP ANAHTARI			
1. D	21. A	41. D	61. B
2. A	22. E	42. C	62. B
3. D	23. C	43. D	63. C
4. D	24. A	44. C	64. D
5. A	25. C	45. A	65. A
6. E	26. E	46. C	66. A
7. C	27. C	47. A	67. C
8. E	28. A	48. B	68. B
9. B	29. D	49. B	69. B
10. C	30. A	50. E	70. E
11. C	31. A	51. B	71. E
12. B	32. C	52. E	72. D
13. D	33. B	53. D	73. E
14. E	34. E	54. B	74. C
15. C	35. D	55. C	75. D
16. D	36. E	56. B	76. D
17. D	37. C	57. C	77. A
18. B	38. A	58. A	78. C
19. D	39. E	59. E	79. C
20. B	40. B	60. D	80. D

DUSDATA® DUS HAZIRLIK MERKEZİ

TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

DUSDATA DUS HAZIRLIK MERKEZLERİ

TUSDATA Yandalda Uzmanlık Sınavı

BAŞARI NEDİR?

Her alanda, sürekli ve kitlesel başarı....

	Sınav birincisi	İlk 10	İlk 100	Ek not
Sonbahar 2023 **TUS**	1. TUSDATA'dan Dr. Hamza TEMİZ	9 kişi	96 kişi	Bunların 88 tanesi Fakülte derecesi DEĞİLDİ! Bunların 22 tanesi 3 büyük ilde DEĞİLDİ!
Sonbahar 2023 **DUS**	1. DUSDATA'dan Dt. Emine Hazan AKÇADOĞAN	9 kişi	72 kişi	Bunların 65 tanesi Fakülte derecesi DEĞİLDİ! Bunların 35 tanesi 3 büyük ilde DEĞİLDİ!
İlkbahar 2023 **YDUS** Pediatri		8 kişi	72 kişi	
İlkbahar 2023 **YDUS** Dahiliye	1. TUSDATA'dan Uz. Dr. Sibel VARELCİ	9 kişi	73 kişi	




Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

Bu tablonun tek anlamı: İşimizi "aşkla";
gerçekten çok iyi yapıyoruz.
Başarı; İSPAT demektir, başarı SÜREKLİLİK demektir.



"Ayinesi İştir Kişinin, Lafa Bakılmaz"



www.dusdata.com